



# CHLORPROMAZINE

## antipsychotique atypique



### Formes et modalités d'administration

Se référer aux RCP pour les posologies !

#### FORMES ORALES

##### Comprimés (25, 100 mg) :

- LARGACTIL®
  - Génériques\* (écrasables)
- \*Aripiprazole Accord, Almus, Arrow, BGR, Cisters, EG, Evolugen, KRKA, Mylan, Sandoz, Teva, Viatrix, Zentiva, Zydus

##### Suspension buvable :

- LARGACTIL® 4% flacon de 30 ou 125 ml

#### FORMES INJECTABLES

##### Libération immédiate :

- LARGACTIL® 25 mg/5 ml, ampoule IM ou IV

Comprimé à prendre en une seule prise pendant ou en dehors des repas

Maintenir le décubitus au moins 1 heure après l'injection. Ne pas mélanger avec d'autres médicaments.

**1 goutte = 1 mg de chlorpromazine**  
**1 mL de solution = 40 gouttes**

**Signes de surdosages :** Syndrome parkinsonien gravissime, coma, convulsions

### Indications thérapeutiques

Traitement de psychose et troubles psychotiques chez les patients adultes

Traitement de la schizophrénie dans les formes chroniques chez l'adulte

Traitement des délires chez l'adulte

Traitement des troubles du comportement dans les formes sévères chez l'enfant à partir de 6 ans

Traitement de l'agitation dans les formes sévères chez l'enfant à partir de 6 ans


Traitement de l'agressivité dans les formes sévères chez l'enfant à partir de 6 ans

Contrôler rapidement l'agitation et l'agressivité chez les patients adultes en cas de psychose, de schizophrénie ou dans les formes non schizophréniques avec agressivité en cas de paranoïa ou d'hallucination

**Contre indication :** Hypersensibilité au principe actif ou à l'un des excipients, risque de glaucome par fermeture de l'angle, risque de rétention urinaire lié à des troubles uréthro-prostatiques, antécédent d'agranulocytose, chez les patients présentant une allergie au blé, chez l'enfant de moins d'un an

#### CARDIO-VASCULAIRE

- Hypotension artérielle orthostatique
- Allongement de l'intervalle QT



#### Effets indésirables

(Liste non exhaustive)

##### ENDOCRINIEN

- Hyperprolactinémie
- Aménorrhée



#### SYSTEME NERVEUX

- Sédation
- Somnolence
- Dyskinésie
- Syndrome extrapyramidal
- Akathisie
- Convulsion
- Hypertonie



#### PSYCHIATRIE

- Anxiété




#### METABOLISME ET NUTRITION

- Prise pondérale
- Altération de la tolérance au glucose

#### GASTRO-INTESTINAL

- Constipation
- Sécheresse buccale





## Suivi cardio-métabolique

	J0	M1	M3	Trimestriel	Annuel	Tous les 5 ans
Poids et IMC	✗	✗	✗	✗		
Glycémie à jeun	✗		✗		✗	
Bilan lipidique (choL, HDL, LDL, TG)	✗		✗			✗
Pression artérielle	✗		✗		✗	

## Précautions d'emploi & Surveillance

Tout patient doit être informé que l'apparition de fièvre, d'angine ou d'une autre infection impose d'avertir tout de suite le médecin traitant et de contrôler immédiatement l'hémogramme. En cas de modification franche de ce dernier (hyperleucocytose, granulopénie), l'administration de ce traitement sera interrompue.

### Syndrome malin des neuroleptiques

Surveiller la température  
 ↳ Arrêt du traitement

### Patients âgés déments

### Accident vasculaire cérébral

### Surveillance renforcée :

- chez les épileptiques
- chez les sujets âgés présentant :
  - sensibilité à l'hypotension orthostatique, à la sédation et aux effets extrapyramidaux
  - une constipation chronique
  - une hypertrophie prostatique
- chez les porteurs d'affections cardiovasculaires
- chez les insuffisants hépatiques et/ou rénaux sévères

## Interactions médicamenteuses

### Association déconseillée :

Médicaments susceptibles de donner des torsades de pointes, antiparkinsonien dopaminergique, médicaments atropiniques, alcool, lévodopa, méthadone, lithium, sédatifs, médicaments baissant le seuil épileptogène

### Allongement de l'intervalle QT

S'assurer de l'absence de :

- Bradycardie < 55 bpm
- Hypokaliémie
- Allongement congénital de l'intervalle QT
- Médicaments contre-indiqués\*



\*Médicament entraînant une bradycardie marquée, une hypokaliémie, un ralentissement de la conduction intracardiaque, un allongement de l'intervalle QT.

**Le traitement doit être arrêté immédiatement** et un autre antipsychotique doit être envisagé dans les situations suivantes :

### Toxicité hépatique sévère

Les patients ou le personnel soignant doivent être informés de signaler immédiatement les symptômes suivants à un médecin : **asthénie, anorexie, nausées, vomissements, douleurs abdominales ou ictère**. Des examens cliniques et biologiques pour évaluer la fonction hépatique doivent être effectués immédiatement.

### Thromboembolie veineuse

### Eosinophilie

### Réaction médicamenteuse avec éosinophilie et symptômes systémiques

### Contre-indication :



Agonistes dopaminergiques hors parkinsoniens, citalopram, escitalopram



Il est préférable d'éviter d'utiliser LARGACTIL® au cours de la grossesse et il est nécessaire de surveiller étroitement les nouveaux-nés en cas de traitement en fin de grossesse. L'allaitement est déconseillé pendant la durée du traitement.

### Documents de référence

Améli - L'Assurance Maladie / Journal Officiel / Avis de la CT / CRAT - Centre de Référence sur les Agents Tératogènes / RCP / Base de données publique des médicaments: <http://www.medicaments.gouv.fr/> / Theriaque.org / Vidal / Information sécurité patients ANSM / Mise au point pharmacovigilance AFSSAPS, mars 2010