

## LE PRODUIT

PAXLOVID® 150 mg/100 mg  
comprimés pelliculés

↳ 2 comprimés de nirmatrelvir  
(soit 300 mg)

↳ 1 comprimé de ritonavir  
(100 mg)

## INITIATION DE TRAITEMENT

## PRESCRIPTION

## POSOLOGIE

## CONTRE-INDICATIONS



## ADMINISTRATION

## SURVEILLANCE

## SUIVI



AAP = Autorisation d'Accès Précoce  
PUT-RD = Protocole d'Utilisation Thérapeutique et de Recueil de Données

# PAXLOVID®

Nirmatrelvir/Ritonavir  
ANTIVIRAL CONTRE LA COVID-19



MAJ 08/02/2022

## INDICATION

PAXLOVID® est indiqué dans le traitement de la COVID-19 chez les adultes de 18 ans et plus ne nécessitant **pas d'oxygénothérapie** et étant à risque élevé d'évolution vers une **forme grave** de la COVID-19.



PAXLOVID® doit être administré **dès que possible après le diagnostic de COVID-19**

ET



dans les **5 jours** suivant l'apparition des symptômes.

Médicament soumis à prescription médicale - Liste I

### Autorisation d'Accès Précoce (AAP)

Vérification de l'éligibilité du patient et fiche de demande d'accès au traitement à remplir par le prescripteur via une plateforme Web dédiée:

[www.ap-paxlovid.com](http://www.ap-paxlovid.com)



Le PUT précise les catégories de patients éligibles à ce traitement



**3 comprimés :**  
300 mg de Nirmatrelvir (2 comprimés de 150 mg)  
+  
100 mg de Ritonavir (1 comprimé de 100 mg)

> Pris ensemble par voie orale **deux fois par jour pendant 5 jours**

### Adaptation posologique :

- Patient avec **insuffisance rénale modérée** : **2 comprimés** : 150 mg de Nirmatrelvir (1 comprimé) + 100 mg de Ritonavir (1 comprimé) toutes les 12h.
- ⚠ Risque important d'interactions médicamenteuses lors de la prise de Paxlovid® avec d'autres traitements. Consultez le lien vers les recommandations thérapeutiques en cas d'associations : <https://sfpt-fr.org/recommandations-et-publications/1611-recommandations-th%C3%A9rapeutiques-dans-le-cadre-d-associations-de-m%C3%A9dicaments-avec-le-nirmatrelvir-ritonavir-paxlovid>

- Patients ayant une insuffisance rénale sévère (DFG < 30mL/min)
- Patients ayant une insuffisance hépatique sévère
- Avec les médicaments dont le métabolisme dépend fortement du CYP3A et pour lesquels des concentrations élevées sont associées à des réactions graves et/ou engageant le pronostic vital
- Avec des médicaments qui sont de puissants inducteurs du CYP3A, la co-administration pouvant entraîner des concentrations plasmatiques significativement réduites de PF-07321332/ritonavir avec un risque de perte de réponse virologique et de résistance potentielle
- L'utilisation concomitante de Paxlovid® et de médicaments qui dépendent fortement du CPY3A ou qui sont de puissants inducteurs du CPY3A est **contre indiquée.**



## VOIE ORALE

PAXLOVID® peut être pris avec ou sans nourriture. Les comprimés doivent être avalés entiers et non mâchés, cassés ou écrasés.



- Le recueil des **effets indésirables/situations particulières** devra être effectué auprès du CRPV géographique via le système national de déclaration : [www.signalement-sante.gouv.fr](http://www.signalement-sante.gouv.fr)



- **Fiche de suivi du traitement** (visite à J28 – appel téléphonique au patient)  
À remplir par le prescripteur sur [www.ap-paxlovid.com](http://www.ap-paxlovid.com)

## Liens utiles

- RCP: <https://ansm.sante.fr/uploads/2022/01/26/20220126-aap-rcp-paxlovid.pdf>
- ANSM: <https://ansm.sante.fr/actualites/covid-19-acces-precoce-accorde-au-paxlovid-en-traitement-curatif>
- CRPV: <https://sfpt-fr.org/recommandations-et-publications/1611-recommandations-th%C3%A9rapeutiques-dans-le-cadre-d-associations-de-m%C3%A9dicaments-avec-le-nirmatrelvir-ritonavir-paxlovid>
- PUT-RD: [https://www.has-sante.fr/plugins/ModuleXitiKLEE/types/FileDocument/doXiti.jsp?id=p\\_3311139](https://www.has-sante.fr/plugins/ModuleXitiKLEE/types/FileDocument/doXiti.jsp?id=p_3311139)
- HAS: [https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2022-01/reco458\\_fiche\\_rr\\_paxlovid\\_mel.pdf](https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2022-01/reco458_fiche_rr_paxlovid_mel.pdf)[https://solidarites-sante.gouv.fr/professionnels/article/dgs-urgent-\\_2022\\_22-paxlovid](https://solidarites-sante.gouv.fr/professionnels/article/dgs-urgent-_2022_22-paxlovid)