

# TRAITEMENT CURATIF DE L'INFECTION À SARS-COV-2

## FICHE PRATIQUE

MAJ 25/01/2022

## XEVUDY Sotrovimab



SOURCES

### PRÉPARATION



Sortie du réfrigérateur



15 min  
à l'abri de la  
lumière



Agiter doucement le flacon d'un mouvement circulaire plusieurs fois avant de l'utiliser



*Ne pas secouer  
Ne pas agiter  
vigoureusement*

### DILUTION


Retirer 8 mL  
de solvant



Poche de 50mL ou 100  
mL de NaCl à  
9mg/mL(0,9%) ou  
dextrose injectable à 5%




Prélever 8 mL du  
flacon de  
sotrovimab



Injecter les 8 mL de  
sotrovimab dans la poche  
via le septum

### ADMINISTRATION



Faire balancer  
doucement la poche de  
perfusion 3 à 5 fois  
d'avant en arrière.



*Ne pas retourner la  
poche de perfusion  
Eviter de former des  
bulles d'air*



Une fois diluée,  
administrer la solution en  
30 min avec un filtre en  
ligne de 0,2 µm.



*Ne pas administrer par  
injection IV rapide ou par  
injection en bolus*

Si l'administration immédiate n'est pas possible, la solution diluée peut être conservée à température ambiante (jusqu'à 25°C) pendant 6 heures maximum ou au réfrigérateur (entre 2°C et 8°C) pendant 24 heures maximum entre le moment de la dilution et la fin de l'administration

### ELIMINATION



Jeter tout produit inutilisé  
restant dans le flacon

Tout médicament non utilisé  
ou déchet doit être éliminé  
conformément à la  
réglementation en vigueur



Le flacon est à  
usage unique et ne  
doit être utilisé que  
pour un seul  
patient

