



MISSION D'ACCOMPAGNEMENT A LA PROMOTION VACCINALE



Céline Valadeau
Pharmacien OMEDIT mission vaccination
vaccination@omedit-nag.fr

Objectif général et thématiques

- Constat : couverture vaccinale encore insuffisante < 95%

- Objectifs (PRS 2018-28) :


- Améliorer la couverture vaccinale
- Faciliter l'accès à la vaccination (parcours vaccinal, intervention sur le parcours de soin)
- Réduire l'hésitation vaccinale

- Programmes d'action sur des thématiques prioritaires :

- Covid-19 (continuité, second rappel)
- Grippe/Covid-19 (Campagnes saisonnières)
- Papillomavirus
- Appuis spécifiques et conjoncturels : Monkeypox

- Public cible : de 11 à 80 ans et plus

Couvertures vaccinales départementales contre les papillomavirus humains « 1 dose » à 15 ans chez les jeunes filles, France, cohorte de naissance 2006*



Source : SNDS-DCIR, Santé publique France, données mises à jour au 31/12/2021


Départements	Total population à risque			Gain de couverture 2019-2022 (points)
	2019-2020 (%)	2020-2021 (%)	2021-2022 (%)	
Charente	49,1%	57,7%	55,5%	+6,4
Charente-Maritime	49,6%	57,9%	55,4%	+5,8
Corrèze	48,9%	58,1%	54,4%	+5,5
Creuse	49,8%	58,7%	53,4%	+3,6
Dordogne	47,2%	53,9%	52,2%	+5,1
Gironde	50,9%	60,0%	56,0%	+5,0
Landes	49,9%	57,5%	55,2%	+5,4
Lot-et-Garonne	45,3%	53,9%	50,7%	+5,4
Pyrénées-Atlantiques	49,9%	59,0%	55,1%	+5,1
Deux-Sèvres	48,4%	56,8%	54,8%	+6,4
Vienne	51,0%	59,7%	57,1%	+6,1
Haute-Vienne	51,0%	61,3%	57,4%	+6,4
Nouvelle-Aquitaine	49,6%	58,2%	55,1%	+5,5
France métropolitaine	48,2%	56,3%	53,1%	+4,9
France entière	47,8%	55,8%	52,6%	+4,8

Source : SNDS-DCIR, Santé publique France, données mises à jour au 31/12/2021. Ces estimations n'incluent pas les personnes avec obésité morbides ni les femmes enceintes qui ne reçoivent pas de bon de prise en charge.

Articulation générale

➤ Articulation de cette mission avec les missions générales de l'OMEDIT

- Appui opérationnel et mise en œuvre de la politique vaccinale de l'ARS en articulation avec :
 - Services de l'ARS
 - Mesvaccins.net : outils (CVE, aide à la décision vaccinale, formations)
 - SpF : logistique de mise à disposition des vaccins issus du stock état, accès aux données de CV
 - Autres partenaires : ES, ESMS, CPTS, PS en ville, CDV permanents, établissements scolaires



Typologie des actions

- Favoriser les campagnes de vaccination en interagissant avec les partenaires impliqués auprès des populations concernées :
 - Promotion
 - Outils (diffusion, création)
 - Suivi des approvisionnements
 - Formations
 - Communications (actions collectives, rencontres, communication SEV, etc.)



IMVANEX

BAVARIAN NORDIC

vaccin antivariolique de troisième génération
AMM européenne 2013

	POSOLOGIE	PRÉPARATION	ADMINISTRATION
Pour les personnes jamais vaccinées contre la variole ou en l'absence de trace de vaccinations antérieures	→ Schéma à 2 doses de 0.5 ml à 28 jours d'intervalle	Décongeler à température ambiante ↓ Tourner délicatement pendant au moins 30 secondes	L'injection du vaccin doit se faire par voie sous-cutanée de préférence dans le haut du bras (gauge < 23) 
Pour les personnes immunodéprimées jamais vaccinées contre la variole [avis ANSM 26 mai 2022]	→ Schéma à 3 doses de 0.5 ml à 28 jours d'intervalle	Inspecter visuellement (couleur jaune pâle à blanche, laiteuse) ↓ Prélever 0.5 ml (primovaccinations et rappels)	Précautions d'emploi : • Ne pas injecter en IV
Pour les personnes précédemment vaccinées contre la variole (fin de l'obligation vaccinale en 1984)	→ Doses inefficaces. Si dose de rappel jugée nécessaire, 1 dose de rappel unique de 0.5 ml		
Pour les personnes immunodéprimées précédemment vaccinées contre la variole	→ 2 doses de rappel de 0.5 ml à 28 jours d'intervalle		
Pour la population pédiatrique			
Pour les femmes enceintes ou allaitantes			

Campagne de 2nd rappel contre le Covid19

Points clés de l'organisation de la vaccination en EHPAD USLD

Quels sont les schémas vaccinaux valides ?

Schémas vaccinaux initiaux valides
détails sur mesconseilscovid

épisode 1 : injection → si > 15 jours → épisode 2 : infection → injection

épisode 1 : infection → délai recommandé : à partir de 2 mois → épisode 2 : injection

épisode 1 : injection → délai variable selon les vaccins → épisode 2 : injection

1er rappel valide
détails DGS n°28

épisode 3 : si injection* → si infection survient + de 3 mois après le schéma initial → épisode 4 : si injection*

2nd rappel valide
détails DGS n°40

épisode 4 : si injection* → si infection survient + de 3 mois après le 1er rappel

*Les rappels doivent uniquement être réalisés avec des vaccins à ARNm : Pfizer (Comirnaty) et Moderna (Spikevax)

Déploiement

- Acteurs au plus proche du terrain :
- Positionnement de Chargés de mission OMEDIT dans les départements (hébergés dans les Délégations départementales ARS) :
 - Appui en fonction des spécificités territoriales ex. actions des CDV permanents
 - Relai des consignes et des recommandations nationales
 - Equipe mobile de promotion de la vaccination
 - Etat des lieux et accompagnement
- Mise en place de réseau de communication en articulation avec l'ARS : identité digitale, pages réseau, page site web



L'équipe Omédit vaccination

OMEDIT siège (bordeaux)

Céline VALADEAU

Pharmacien mission
vaccination

Référente thématique vaccination

Juliette BRAUD

Chargée de missions
régionale

Mission vaccination

En département

A compter de juillet 2022

Recrutement de 8 chargés de mission :

- 1 pour les dép. 16 et 17
- 1 pour les dép. 19 et 24
- 1 pour les dép. 23 et 87
- 2 pour les dép. 33 et 47
 - 1 pour le dép. 40
 - 1 pour le dép. 64
- 1 pour les dép. 79 et 86

A compter de septembre 2022

Recrutement de 5 autres chargés de mission

= 1 par dép. (2 pour le 33)

Résultats attendus

Cible de CV	99%	95%	65%	55%
Vaccination	DTP (3 doses)	Hépatite B (3 doses)	Grippe - 65 ans et +	HPV (2 doses) - filles et garçons âgés de 15 ans et 16 ans (2 doses).
	Coqueluche (3 doses)	ROR (2 doses)	Grippe chez les soignants	
	Haemophilus influenza b (3 doses)	Pneumocoque (3 doses)		
		Méningocoque C		
		Covid - 65 ans et +, personnes fragiles et soignants		
	Méningocoque B - enfants nés à partir de 2022			

PRS 2018-2028



MERCI DE VOTRE ATTENTION

Suivez-nous !

Linkedin

Twitter

OMEDIT NAG

CONTACTEZ NOUS



Cellule vaccination 05.57.01.47.03/06



vaccination@omedit-nag.fr

