

# FICHE PRATIQUE : PAXLOVID®

## ANTIVIRAL CONTRE LA COVID-19

### 1 SYMPTOMES COVID19

- ✓ Faire réaliser un test PCR ou TAG si non fait



### 3 PRESCRIPTION

- ✓ Prescription sur l'ordonnancier habituel
- ✓ Mentionner sur la prescription le délai maximal pour initier le traitement (**5 jours suivant le début des symptômes**)
- ✓ Prescription sur une ordonnance dite "**de dispensation conditionnelle**" valide **3 mois**, sous réserve de la réalisation d'un test positif



### 2 VÉRIFICATION DE L'ÉLIGIBILITÉ DU PATIENT

- ✓ Test SARS-CoV-2 positif (RT-PCR ou antigénique)
- ✓ Apparition des premiers symptômes attribuables à la maladie COVID-19 < 5 jours
- ✓ Adultes qui ne nécessitent pas de supplémentation en oxygène et qui présentent un risque accru d'évolution vers une forme sévère de la COVID-19



#### Recommandations de l'ANRS-MIE (DGS Urgent n°2022-86)

Le Paxlovid reste le traitement **CURATIF** de 1ère intention quel que soit le variant ou sous-variant de SARS-CoV-2.

Il est **indiqué quel que soit le statut vaccinal** chez les patients :

- d'âge >65 ans
- porteurs d'une immunodépression, quel que soit leur âge
- non-immunodéprimés présentant une comorbidité à haut risque de forme sévère quel que soit leur âge

### 4 POSOLOGIE

2 comprimés de **nirmatrelvir** PF-07321332  
+  
1 comprimé de **ritonavir**



**A prendre par voie orale deux fois par jour pendant cinq jours**  
1 boîte = 1 patient pendant 5 jours (si pas d'adaptation posologique)

#### Résumé des caractéristiques du produit (RCP)

##### Mises en garde :

- Paxlovid est **contre-indiqué** chez les personnes avec une **insuffisance rénale sévère** ou une **insuffisance hépatique sévère**.
- Paxlovid® n'est pas recommandé pendant la **grossesse** et chez les **femmes en âge de procréer sans contraception**.
- L'utilisation du Paxlovid peut réduire l'efficacité des **contraceptifs** (utilisation d'une méthode barrière supplémentaire recommandée)

Les **posologies sont à adapter** en fonction des autres traitements du patient (ritonavir = inhibiteur du CYP3A4 - risque d'interaction médicamenteuse) et/ou en cas d'**insuffisance rénale modérée**.

Plusieurs outils sont disponibles pour évaluer le risque d'interactions médicamenteuses et la nécessité d'adaptation posologique :

**0 800 130 000**

Un **numéro vert** ouvert 5 jours sur 7 de 9h à 18h où un **pharmacologue** du Centre régional de Pharmacovigilance référent vous répond



**Recommandations thérapeutiques** dans le cadre d'associations de médicaments avec le Paxlovid® de la **Société Française de Pharmacologie et Thérapeutique (SFPT)**



Une **fiche d'appui à la prescription** est présente en **annexe du DGS Urgent n°2022-80**.

### 5 COMMANDE ET APPROVISIONNEMENT

- **Pour les pharmacies d'officines**
  - Approvisionnement par le **grossiste-répartiteur (code CIP 34009 302 455 1 4)**
  - Possibilité de disposer d'un stock d'avance (1 ou 2 boîtes) issues du stock Etat
- **Pour les PUI :**
  - Approvisionnement selon le circuit classique.
  - Dépannage possible directement auprès d'autres PUI disposant de stock
  - Suivi des stocks via la plateforme eDispostock (saisie hebdomadaire) à poursuivre

### 6 DISPENSATION

Le pharmacien s'assure que le **délai d'initiation du traitement n'a pas été dépassé**, et le cas échéant de l'**absence d'une interaction médicamenteuse contre-indiquée**

#### Liens utiles :

- Base de données publique des médicaments : [Résumé des caractéristiques du produit \(RCP\) Paxlovid®](#)
- DGS : annexe du [DGS-URGENT N°2022\\_80](#) + [DGS DGS-URGENT N°2022\\_52](#) concernant l'évolution du circuit de mise à disposition du PAXLOVID® + [DGS URGENT N°2022-86](#) sur les traitements COVID
- Société Française de Pharmacologie et de Thérapeutique : [Recommandations thérapeutiques dans le cadre d'associations de médicaments avec le NIRMATRELVIR/RITONAVIR \(PAXLOVID\)](#)