




## Indication

Veklury est indiqué pour le **traitement de la maladie COVID-19** chez :



Les patients (âgés de 12 ans ou plus et pesant au moins 40kg), hospitalisés pour la COVID-19 avec une pneumonie nécessitant une oxygénothérapie à faible débit



**Agrément aux collectivités** (arrêté du 4 août 2022, suite à l'avis de la CT le 23 octobre 2020)



Administration par **voie IV** (perfusion après reconstitution et dilution)



La durée totale du traitement doit être **au minimum de 5 jours** et **ne pas être supérieure à 10 jours**.



## Recommandation d'utilisation

### Traitement de la Covid-19 : en 2ème intention

Veklury est recommandé en cas de **contre-indication au Paxlovid®** (notamment liée aux interactions médicamenteuses), en deuxième intention dans la prise en charge du Covid-19, en l'absence de contre-indication rénale, du fait d'une efficacité in vitro maintenue quel que soit le variant

Source : DGS Urgent N°2022-86 du 22 décembre 2022

## Posologie



Une dose de charge unique de 200 mg (perfusion IV)



Une dose de 100 mg (perfusion IV) par jour

**1 patient = Entre 6 (min) et 11 flacons (max)**

**Insuffisance rénale :** La pharmacocinétique n'a pas été évaluée chez les patients ayant une insuffisance rénale. **Le remdesivir ne doit pas être utilisé chez les patients avec un DFGe < 30 ml/min**

**Insuffisance hépatique :** non évaluée

**Personnes âgées :** Aucune adaptation posologique nécessaire chez les patients âgés de plus de 65 ans

**Grossesse :** Le remdesivir ne doit pas être utilisé pendant la grossesse à moins que la situation clinique de la femme ne justifie le traitement avec ce médicament

## Approvisionnement



- Approvisionnement par le stock Etat :
  - Contactez et transmettez vos besoins à l'OMEDIT Nouvelle-Aquitaine Guadeloupe** à l'adresse suivante : [omedit@omedit-nag.fr](mailto:omedit@omedit-nag.fr)
- Renseignement hebdomadaire des stocks sur e-dispostock