

## 1 SYMPTOMES COVID-19

Faire réaliser un test PCR ou TAG si non fait



## 2 VÉRIFICATION DE L'ÉLIGIBILITÉ DU PATIENT

- Test SARS-CoV-2 positif (RT-PCR ou antigénique)
- Apparition des premiers symptômes attribuables à la COVID-19 < 5 jours
- Adultes qui ne nécessitent pas de supplémentation en oxygène et qui présentent un risque accru d'évolution vers une forme sévère de la COVID-19

### NEW Recommandations de l'ANRS-MIE (DGS\_Urgent n°2022-86)

Le Paxlovid reste le traitement **CURATIF** de 1ère intention quel que soit le variant ou sous-variant de SARS-CoV-2.

Il est **indiqué quel que soit le statut vaccinal** chez les patients :

- d'âge >65 ans
- porteurs d'une immunodépression, quel que soit leur âge
- non-immunodéprimés présentant une comorbidité à haut risque de forme sévère quel que soit leur âge



## 3 PRESCRIPTION

- Prescription sur l'ordonnancier habituel
- Mentionner sur la prescription le délai maximal pour initier le traitement (**5 jours suivant le début des symptômes**)
- Possibilité de prescription sur une ordonnance dite "**de dispensation conditionnelle**" valide **3 mois**, sous réserve de la réalisation d'un test positif



[Résumé des caractéristiques du produit \(RCP\)](#)



## 4 POSOLOGIE ET MODALITÉS D'ADMINISTRATION

### • Si pas d'adaptation posologique :

2 comprimés de nirmatrelvir PF-07321332 + 1 comprimé de ritonavir

A prendre en même temps, avec ou sans nourriture

A prendre par voie orale deux fois par jour pendant cinq jours

1 boîte = 1 patient pendant 5 jours (si pas d'adaptation posologique)

### • En cas d'adaptation posologique (réduction de la dose) : informer le patient sur les comprimés à prendre

- Les comprimés doivent être avalés entiers et non mâchées, cassés ou écrasés (absence de données)
- Conduite à tenir en cas d'oubli :
  - oubli < 8h : la prendre dès que possible puis reprise du schéma posologique habituel
  - oubli > 8h : ne pas prendre la dose oubliée, prendre la dose suivante à l'heure prévue. Ne pas doubler la dose pour compenser la dose oubliée

### Mises en garde :

- Paxlovid® est **contre-indiqué** chez les personnes avec une **insuffisance rénale sévère** ou une **insuffisance hépatique sévère**.
- Paxlovid® n'est pas recommandé pendant la **grossesse** et chez les **femmes en âge de procréer sans contraception**.
- L'utilisation du Paxlovid® peut réduire l'efficacité des **contraceptifs** (utilisation d'une méthode barrière supplémentaire recommandée)

Les **posologies sont à adapter** en fonction des autres traitements du patient (ritonavir = inhibiteur du CYP3A4 - risque d'interaction médicamenteuse) et/ou en cas d'**insuffisance rénale modérée**.

Plusieurs outils sont disponibles pour évaluer le risque d'interactions médicamenteuses et la nécessité d'adaptation posologique :

 0 800 130 000

Un **numéro vert** ouvert 5 jours sur 7 de 9h à 18h où un **pharmacologue** du Centre régional de Pharmacovigilance référent vous répond



**Recommandations thérapeutiques** dans le cadre d'associations de médicaments avec le Paxlovid® de la **Société Française de Pharmacologie et Thérapeutique (SFPT)**



Une **fiche d'appui à la prescription** est présente en **annexe du DGS Urgent n°2022-80**.

## 5 COMMANDE ET APPROVISIONNEMENT



- Pour les pharmacies d'officines**
  - Approvisionnement par le **grossiste-répartiteur**
  - Possibilité de disposer d'un stock d'avance (1 ou 2 boîtes)
- Pour les PUI :**
  - Approvisionnement selon le circuit classique.
  - Dépannage possible directement auprès d'autres PUI disposant de stock
  - Suivi des stocks via la plateforme eDispostock (saisie hebdomadaire) à poursuivre

## 6 DISPENSATION



Le pharmacien s'assure que le **délai d'initiation du traitement n'a pas été dépassé**, et le cas échéant de l'**absence d'une interaction médicamenteuse contre-indiquée**

### Liens utiles

- Base de données publique des médicaments : [Résumé des caractéristiques du produit \(RCP\) Paxlovid®](#)
- DGS : annexe du [DGS-URGENT N°2022\\_80](#) + [DGS DGS-URGENT N°2022\\_52](#) (évolution du circuit de mise à disposition du PAXLOVID®) + [DGS URGENT N°2022-86](#) sur les traitements COVID
- Société Française de Pharmacologie et de Thérapeutique : [Recommandations thérapeutiques dans le cadre d'associations de médicaments avec le NIRMATRELVIR/RITONAVIR \(PAXLOVID\)](#)