



ZUCLOPENTHIXOL

antipsychotique atypique



Formes et modalités d'administration

FORMES ORALES

Comprimés et comprimés orodispersibles (10, 25 mg):

- CLOPIXOL®

Suspension buvable

- CLOPIXOL® 2% flacon de 20 mL

FORMES INJECTABLES

(strictement Intra-Musculaire) Libération semi-prolongée :

- CLOPIXOL® 50 mg/mL, ampoule IM

Libération prolongée :

- CLOPIXOL® 200 mg/mL, ampoule IM
- CLOPIXOL AIP® 200 mg/mL, ampoule IM

Il est recommandé d'utiliser une seringue en verre. Ce médicament ne doit pas être mélangé avec d'autres médicaments. Lorsque le volume à injecter dépasse 2 mL, il convient de le répartir en 2 injections dans chacune des 2 fesses à des endroits différents.

Se référer aux RCP pour les posologies !

Indications thérapeutiques

Traitement des **psychoses et troubles psychiques** dans les formes chroniques avec hallucinations ou non

Traitement des **troubles du comportement** chez l'**enfant** dans les formes sévères avec **agitation et agressivité**

Traitement de la **schizophrénie** dans les formes chroniques en cas de psychose

Traitement des **délires**

Traitement initial des **psychoses et troubles psychotiques**

Traitement de courte durée de **l'agitation et de l'agressivité** au cours d'états psychotiques

ETAT GENERAL

- Fièvre
- Asthénie
- Malaise
- Hypothermie
- Hypersensibilité



PSYCHIATRIE

- Confusion
- Agitation
- Dépression
- Diminution de la libido
- Apathie
- Anxiété
- Insomnie



CARDIO-VASCULAIRE

- Hypotension artérielle orthostatique
- Tachycardie



ORGANES DES SENS

- Crise oculogyre
- Troubles de l'accommodation



Effets indésirables

(Liste non exhaustive)

SYSTEME NERVEUX

- Convulsion
- Dyskinésie
- Somnolence
- Hypotonie
- Tremblements
- Sensation vertigineuse
- Troubles de la marche
- Syndrome extrapyramidal
- Troubles de l'élocution
- Syndrome malin des neuroleptiques
- Ataxie
- Dystonie
- Akathisie
- Syncope



GASTRO-INTESTINAL

- Hypersalivation
- Sécheresse buccale
- Douleurs abdominales
- Nausées
- Vomissements
- Diarrhée
- Constipation



METABOLISME ET NUTRITION

- Hyperglycémie
- Hyperlipidémie
- Intolérance au glucose
- Augmentation ou diminution de l'appétit
- Prise ou perte de poids

PEAU ET TISSU SOUS CUTANE

- Prurit
- Hyperhidrose
- Eruption cutanée



SANGUIN ET LYMPHATIQUE

- Agranulocytose
- Thrombopénie
- Leucopénie
- Neutropénie



RENAUX ET GENITO-URINAIRE

- Rétention urinaire
- Trouble de la miction
- Trouble de l'érection
- Trouble de l'éjaculation
- Gynécomastie
- Galactorrhée
- Aménorrhée



RESPIRATOIRE

- Dyspnée






Signes de surdosages : Somnolence, coma, syndrome extrapyramidal, convulsions, choc, hyperthermie/hypothermie

Contre indication : Hypersensibilité à la substance active ou à l'un des excipients, risque de glaucome par fermeture de l'angle, risque de rétention urinaire lié à des troubles uréthro-prostatiques, insuffisances hépatiques et/ou rénales graves, troubles de la conscience quelle qu'en soit la cause (par exemple due à une intoxication à l'alcool, aux barbituriques ou aux opiacés), coma, en association avec un dopaminergique hors parkinson (cabergoline, quinagolide), le citalopram, l'escitalopram, l'hydroxyzine, la dompéridone, la pipéraquline.



Suivi cardio-métabolique et surveillance



	J0	M1	M3	Trimestriel	Annuel	Tous les 5 ans
Poids et IMC	×	×	×	×		
Glycémie à jeun	×		×		×	
Bilan lipidique (choL, HDL, LDL, TG)	×		×			×
Pression artérielle	×		×		×	
Périmètre ombilical	×					

Précautions d'emploi

Allongement de l'intervalle QT

S'assurer de l'absence de :

- Bradycardie < 55 bpm
- Hypokaliémie
- Allongement congénital de l'intervalle QT
- Médicaments contre-indiqués*



*Médicament entraînant une bradycardie marquée, une hypokaliémie, un ralentissement de la conduction intracardiaque, un allongement de l'intervalle QT.

Administration à éviter chez les femmes enceintes. Faire une surveillance clinique du nouveau-né. Allaitement contre-indiqué pendant le traitement.



Personnes âgées

Prudence chez des patients présentant des facteurs de risque d'AVC et chez ceux atteints de démence.



Clopixol n'est pas autorisé dans le traitement des troubles du comportement liés à la démence

Prudence :

- sujets âgés
- affections cardio-vasculaires graves
- insuffisances rénales ou hépatiques
- parkinsoniens nécessitant un traitement neuroleptique

Hyperthermie inexpliquée

↪ Arrêt du traitement

Surveillance :

- chez les patients épileptiques
- chez les sujets présentant d'autres facteurs prédisposants (atteinte cérébrale)
- Surveillance biologique (transaminases, tests hépatiques) chez les alcooliques chroniques et les patients avec antécédant d'atteinte hépatique sérieuse

Liées aux excipients

Les patients présentant une intolérance au galactose, un déficit total en lactase ou un syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ne doivent pas prendre ce médicament

Interactions médicamenteuses

Précautions d'emploi :

β-bloquants, bradycardisants, hypokaliémisants, anagrelide, azithromycine, clarithromycine, roxithromycine, ondansétron, lithium, ciprofloxacine, lévofloxacine, norfloxacine, médicaments atropiniques, sédatifs, médicaments abaissant la pression artérielle

Contre-indication :



Dopaminergiques hors Parkinsonien (cabergoline, quinagolide), citalopram, escitalopram, dompéridone, hydroxyzine, pipéraquline

Association déconseillée :

Alcool, lévodopa, hydroxychloroquine, méthadone, sodium, antiparkinsoniens dopaminergiques, médicaments susceptibles de donner des torsades de pointes



Documents de référence

Améli - L'Assurance Maladie / Journal Officiel / Avis de la CT / CRAT - Centre de Référence sur les Agents Tératogènes / RCP / Base de données publique des médicaments: <http://www.medicaments.gouv.fr/> / Theriaque.org / Vidal / Information sécurité patients ANSM / Mise au point pharmacovigilance AFSSAPS, mars 2010

Mise à jour: décembre 2022