

Actualisation en fonction de l'évolution de la pandémie (prédominance du variant Omicron BA.5 et son sous-lignage BQ1.1)

Dernier avis des autorités sanitaires nationales et des experts (DGS Urgent n°2022_86 du 22 décembre 2022 et DGS Urgent n°2023_05 du 31 janvier 2023)

PROPHYLAXIE PRÉ-EXPOSITION



Maintien des gestes barrières



Vaccination

Pour plus d'information, retrouvez les fiches pratiques sur les vaccins disponibles actuellement sur le site de l'OMEDIT NA-G, onglet vaccination et en cliquant [ici](#).

EVUSHELD (TIXAGÉVIMAB/CILGAVIMAB)

ANTICORPS MONOCLONAUX Prescription :

Ordonnance classique

- **Prise en charge :** AMM

Disponibilité : Etablissement de santé

Approvisionnement :

NON RECOMMANDÉ
(DGS-Urgent n°2023-05 du 31.01.2023)

Depuis le 31.01.2023 (DGS-Urgent n°2023-05) EVUSHELD n'est plus recommandé en prophylaxie pré-exposition en raison de :

- l'augmentation de la circulation du variant BQ1.1
- la résistance de BQ1.1 à la neutralisation par EVUSHELD
- la diminution de l'incidence du SARS-CoV-2 nationale
- la persistance d'un signal de pharmacovigilance (EI cardiovasculaires) même si peu fréquents

Retrouvez l'[avis de l'ANRS-MIE du 16 janvier 2023](#) pour plus d'information



Pour plus d'information:

Retrouvez toutes les fiches pratiques sur le site de l'OMEDIT NA-G <https://www.omedit-nag.fr/outils-guides/covid>

TRAITEMENT CURATIF

1^{ère}

Intention

PAXLOVID (NIRMATRELVIR/RITONAVIR)

ANTIVIRAL EN COMPRIMÉ

Indication :

Adultes qui ne nécessitent pas de supplémentation en oxygène et à risque accru d'évolution vers une forme sévère

Prescription :

Ordonnance classique
Possibilité de **dispensation conditionnelle** (= délivrance sur présentation d'un test positif) sur ordonnance valide 3 mois

Prise en charge : AMM

Disponibilité :

- Etablissement de santé
- Pharmacie de ville

Approvisionnement : Circuit classique

Recommandations de l'ANRS-MIE:

Indiqué **quelque soit le statut vaccinal** si :

- Age supérieur à 65 ans
- Porteurs d'une immunodépression
- Non-immunodéprimés présentant une comorbidité à haut risque de forme sévère quel que soit leur âge

Posologie et administration :

- 300mg de nirmatrelvir (2cp) + 100 mg ritonavir (1cp), **deux fois par jour, pendant 5 jours**
- 1 boîte = 30 cp = 1 patient

Vigilance:

- **Interactions médicamenteuses**
- **Insuffisances rénale et hépatique**

2^{ème}

Intention

VEKLURY (REMDESIVIR)

ANTIVIRAL EN PERFUSION

En cas de contre-indication au Paxlovid, notamment liée aux interactions médicamenteuses, et en l'absence de contre-indication, notamment rénale.

Source : DGS Urgent N°2022-86 du 22 décembre 2022

- Pas d'utilisation chez l'insuffisant rénal sévère

Posologie et administration :

- J1 : 200 mg en IV
- J2 et suivants : 100 mg/jour en IV

Prescription :

Ordonnance classique

Prise en charge : AMM

Disponibilité :

Etablissement de santé

Approvisionnement :

Contactez directement le laboratoire



ANTICORPS MONOCLONAUX (NOTAMMENT EVUSHELD)

L'utilisation d'EVUSHELD en traitement curatif n'est plus recommandée (perte d'activité neutralisante sur le variant Omicron BA.5 et ses sous-lignages dominants dont BQ.1.1) → DGS_Urgent n°2022-86 du 22 décembre 2022

Ou cliquez sur les médicaments !

EVUSHELD

PAXLOVID

VEKLURY