

Toujours effectuer le vaccin 13 valences avant celui à 23 valences

Quelles sont les recommandations vaccinales ?

Vaccination obligatoire pour tous les nourrissons nés depuis le 1er janvier 2018

Vaccination recommandée pour les personnes à risque

liste des personnes à risque

Les immunodéprimés

- **Aspléniques** ou hypospléniques
- Atteints de **déficits immunitaires héréditaires**
- **VIH**
- Patients présentant une **tumeur solide** ou une hémopathie maligne
- **Transplantés** ou en attente de transplantation d'organe solide
- **Greffés de cellules souches hématopoïétiques**
- Traités par **immunosuppresseur**, **biothérapie** et/ou **corticothérapie** pour une maladie auto-immune ou inflammatoire chronique
- Atteints de **syndrome néphrotique**

Les non-immunodéprimés

- **Cardiopathie congénitale cyanogène**
- insuffisance **cardiaque** ou **rénale**
- Insuffisance **respiratoire** chronique
- **bronchopneumopathie** obstructive ou **emphysème**
- **Asthme** sévère sous traitement continu
- **Hépatopathie** chronique d'origine alcoolique ou non
- **Diabète** non équilibré par le simple régime
- Patients présentant une brèche **ostéo-méningée**, un implant **cochléaire** ou candidats à une implantation cochléaire

Quels sont les vaccins disponibles ?



Prevenar 13® (conjugué)

- impact sur le portage ce qui protège toute la population
- efficacité : supérieure à 90% chez le nourrisson (VIS)
- CI : hypersensibilité aux substances actives, à l'un des excipients ou à l'anatoxine diphtérique




Pneumovax® (23 valences, non-conjugué)

- uniquement recommandé chez les personnes à risque
- peu immunogène chez les enfants < 2 ans
- efficacité : 30% sur les pneumonies (VIS)
- CI : hypersensibilité à l'un des composants du vaccin

Quels sont les schémas vaccinaux ?

SCHÉMA RECOMMANDÉ POUR L'OBLIGATION VACCINALE



Bon à savoir



Les infections à pneumocoques sont responsables de nombreuses infections : otites, sinusites, méningites, bactériémies, pneumonies qui peuvent se diffuser dans les sites stériles : septicémies, méningites, arthrites

+1 000
+ 800
+ 120

En 2020, le nombre d'infections invasives à pneumocoques était de 2137, dont 1073 chez les plus de 65 ans, 853 chez les 15-64 ans et 127 chez les moins de 2 ans. L'incidence de ces infections était en baisse jusqu'en 2015 puis est repartie à la hausse jusqu'à la période pré-pandémique (SpE)

4.5%

En 2018, seulement 4.5% des adultes à risque étaient à jour de leur vaccination (Wyplosz)



Les effecteurs de cette vaccination sont les médecins et les sages-femmes pour les enfants. Dès 11 ans, les pharmaciens et les infirmiers peuvent également prescrire et administrer ce vaccin.

Liens utiles :

- calendrier vaccinal 2023
- flyer 1 Santé Publique France
- flyer 2 Santé Publique France
- vaccination info service (VIS)
- mesvaccins.net

