

PANSEMENTS PARTICULIERS

- Pansement à la PVP iodée = BETADINE TULLE
- Pans.à l'Ibuprofène = BIATAIN IBU(plus stock)
- Pansement « booster » = URGOSTART hydro simple cellulaire 13x12 cm et interface 10x10
- Pansement au charbon = VLIWAKTIV 10 x 10 cm
- Pansement ALGOSTERIL (sur ordonnance - plaie hémorragique et/ou infectée)
Plaque 10 x 10 cm
Mèche plate 5 x 40 cm et mèche ronde 30 cm
- pansement à l'acide hyaluronique = IALUSET crème tube 100 gr, IALUSET compresse 10 x 10 cm

TULLE GRAS/ INTERFACE

- TULLE GRAS : Jelonet : 10 x 10 cm
10 x 40 cm



RISQUE DE MACÉRATION

- INTERFACE : Urgotul : 10 X10 cm
15 x 20 cm

BOURGEONNEMENT
ÉPIDERMISATION

CICATRISER -
PROTÉGER

PANSEMENTS EN MILIEU HUMIDE DISPONIBLES A LA PUI DU CH DE JONZAC POUR UNE CICATRISATION DIRIGÉE (marché 2017-2020)

HYDROCOLLOÏDE EXTRA MINCE

COMFEEL PLUS
Plaque transparente
10 x 10 cm et 15 x 15 cm
Comfeel contour standard (PM)

ÉPIDERMISATION

CICATRISER -
PROTÉGER
PANSEMENT I ou II

PROTECTION DE LA PEAU PÉRILÉSIONNELLE

- BEPANTHEN pommade 30 gr
- CONVEEN PROTACT crème 100 gr
- SKIN BARRIER SPRAY, film de protection 50 ml
- PATE A L'EAU crème 75 gr
- DUODERM pâte hydrocolloïde 30 gr
- SPRAY de barrière cutanée Brava (existe en lingette imprégnée)

FILM POLYURÉTHANE

TEGADERM stérile
10 x 12 cm

TEGADERM non stérile
Rouleau 15 cm

STERIDRAPE stérile 10 X 20 cm 25 x 28 cm
28 x 41 cm

FIN D'ÉPIDERMISATION

PROTÉGER ET OU
PANSEMENT II

HYDROCOLLOÏDE

COMFEEL PLUS
Plaque opaque
10 x 10 cm
15 X 15 cm

DUODERM PATE

BOURGEONNEMENT

ABSORBER
CICATRISER
PROTEGER

HYDROCELLULAIRE

BIATAIN

Plaque adhésive : 12,5 x 12,5 cm

Plaque non adhésive : 10 x 20 cm et 15 X 15 cm

Cavité 5 X 8 cm

sacrum (adhésif)

talon (adhésif)

NB:Allevyn sacrum 17x17(kyste sacro coccygien-
consul ext chir)

Mepilex Border EM

6 X 12 cm et 10 X 20 cm

Siliconé sur toute la surface

BOURGEONNEMENT

ABSORBER -
CICATRISER

ALGINATE

BIATAIN ALGINATE : mèche 3 x 44 cm

BIATAIN ALGINATE

10 x 10 cm

15 x 15 cm

Ne pas dépasser la plaie pour éviter de ramollir le
pourtour. Replier, recouper si besoin.

FIBRINE

ABSORBER - HYDRATER

DRAINER

HYDROFIBRE et superabsorbant

Aquacel extra : 12,5 x 12,5 cm

Aquacel mèche : 2,5 x 40 cm

Pansement superabsorbant (Vliwasorb)4tailles.
composition différente à base de polyacrylate de
sodium. Peut être mis à même la plaie très
exsudative au stade de bourgeonnement.

Urgoclean mèche 5x40cm

FIBRINE

BOURGEONNEMENT

ABSORBER

++

PANSEMENT IRRIGO-ABSORBANT

HYDROCLEAN

7,5 x 7,5 cm

10 x 10 cm

Ø 4 cm

HYDROCLEAN CAVITY

Ø 4 cm

Ø 10 cm

ovale 4 x 7 cm

Adapter à la plaie. Protéger la peau péri lésionnelle

NECROSE
FIBRINE
BOURGEONNEMENT

RAMOLLIR -
HYDRATER
ABSORBER -
DRAINER

HYDROGEL

GEL PURILON tube 15 gr



A mettre uniquement sur la nécrose

et protéger la peau périlésionnelle

NECROSE

RAMOLLIR - HYDRATER

PANSEMENTS ANTIMICROBIENS

- Biatain ARGENT :15 x 15 cm et 23 x 23 cm
sur base hydrocellulaire
- Aquacel argent : 10 x 12 cm et 15 x 20 cm
sur base hydrofibre
- Ialuset+ : crème 100 gr, compresse 10 x 10 cm
- Altreet argent : 10 x 10 cm sur interface

Traitement à l'argent max. 15 jours avec ±
antibiothérapie systémique.

- SORBACT : hydrogel 7.5x7.5cm, compresse
7x9cm, mèches : 2cmx50cm et 10cmx200 cm,
Pansement absorbant 10x20cm avec ±
antibiothérapie systémique



RESPECTER LA COLONISATION
NATURELLE DE LA PLAIE

SURINFECTION

LIMITER LA
PROLIFÉRATION
EXAGÉRÉE

