




Testez vos connaissances SUR LA VACCINATION ?

Un moment **pour vous**, un geste **pour votre santé**.

#JeMeVaccine

#JeNousProtège

Mots fléchés : Les vaccins et leurs indications



MOT MYSTÈRE



HORIZONTAL :

1. Vaccin trivalent obligatoire chez le nourrisson. Dès l'âge de 6 ans, des rappels sont effectués assez régulièrement.
4. Vaccin obligatoire chez le nourrisson. Cette vaccination est particulièrement recommandée chez la femme enceinte, à chaque grossesse.
6. Vaccin recommandé tous les ans voire 2 fois par an (à l'automne et au printemps) pour les personnes à risque de forme grave dès l'âge de 6 mois.
9. Vaccin bactérien obligatoire chez tous les nourrissons depuis le 1^{er} janvier 2025, et recommandé chez les adultes à risque.
11. Vaccin bactérien obligatoire chez le nourrisson. Peut être retrouvé dans un vaccin protégeant également contre 4 ou 5 maladies infectieuses.
12. Vaccin trivalent obligatoire chez le nourrisson et recommandé à toutes les personnes depuis 1980. Les professionnels de santé, certains voyageurs et les cas contacts sont également concernés par cette vaccination.
13. Vaccin viral recommandé chaque année aux personnes fragiles ou de 65 ans et plus mais aussi les personnes atteintes de maladies chroniques et/ou souffrant d'obésité, les femmes enceintes, les enfants à partir de 6 mois et les professionnels de santé et elle peut être proposé à tous les enfants de 2 à 17 ans. La vaccination doit avoir lieu au moins 2 semaines avant le début de l'épidémie.

VERTICAL :

2. Vaccin bactérien obligatoire (pour se protéger notamment contre des affections respiratoires) chez le nourrisson dès 2 mois. Il est aussi recommandé chez les adultes fragiles mais aussi chez les 65 ans et plus depuis avril 2025.
3. Vaccination recommandée chez les personnes immunodéprimées à partir de 18 ans et chez toutes les personnes âgées de 65 ans et plus avec un nouveau vaccin sorti en 2024.
5. Vaccin viral recommandé à toutes les filles et garçons de 11 à 14 ans. Un rattrapage est possible jusqu'à 19 voire 26 ans.
7. Nouveau vaccin quadrivalent obligatoire chez le nourrisson depuis le 1^{er} janvier 2025 avec 1 dose à l'âge de 6 mois suivi d'une 2^{ème} dose à l'âge de 12 mois. 1 dose recommandée également chez les adolescents entre 11 et 14 ans et rattrapage possible jusqu'à l'âge de 24 ans.
8. Vaccin viral recommandé chez tous les nourrissons. Il s'administre sous forme buvable.
10. Vaccin bactérien recommandé aux nourrissons particulièrement exposés. N'est plus obligatoire depuis 2007.

HORIZONTAL : 1. DTP - 4. COQUELUCHE - 6. COVID-19 - 9. MÉNINGOCOQUE B - 11. HIB - 12. ROR - 13. GRIPPE - 13. PNEUMOCOQUE - 3. ZONA - 5. HPV - 7. MÉNINGOCOQUE ACWY - 8. ROTAVIRUS - 10. BCG - MOT MYSTÈRE : ANTICORPS



Testez vos connaissances SUR LA VACCINATION ?

Un moment **pour vous**, un geste **pour votre santé**.

#JeMeVaccine

#JeNousProtège

Mots fléchés : Les vaccins et leurs indications

P	N	E	U	M	O	C	O	Q	U	E	S	B	A
C	H	N	I	G	C	U	C	N	A	M	P	Q	S
W	O	L	W	Z	O	V	J	X	I	F	W	C	K
Q	V	A	C	C	I	N	A	T	I	O	N	N	H
H	M	E	N	I	N	G	O	C	O	Q	U	E	S
R	O	U	G	E	O	L	E	J	U	S	I	G	F
W	R	O	T	A	V	I	R	U	S	Z	M	B	X
C	A	Y	Z	O	N	A	P	H	P	V	L	S	Y
W	T	R	V	Y	J	T	N	U	A	R	S	O	O
S	N	L	H	B	Q	B	G	R	G	S	E	Y	Q
I	T	E	T	A	N	O	S	Z	G	R	D	G	S
C	O	V	I	D	R	I	M	E	M	H	H	G	G
E	V	R	S	R	B	H	A	S	Y	B	M	Y	H
O	Q	F	E	G	R	I	P	P	E	O	W	Y	T

- ARS
- COVID
- EMH
- HAS
- MENINGOCOQUES
- ROTAVIRUS
- TETANOS
- VRS
- CNAM
- DGS
- GRIPPE
- HPV
- PNEUMOCOQUES
- ROUGEOLE
- VACCINATION
- ZONA

PNEUMOCOQUES : 1ère LIGNE HORIZONTALE, CNAM : 2ème LIGNE HORIZONTALE, VACCINATION : 4ème LIGNE HORIZONTALE, MENINGOCOQUES : 5ème LIGNE HORIZONTALE, ROUGEOLE : 6ème LIGNE HORIZONTALE, ROTAVIRUS : 7ème LIGNE HORIZONTALE, ZONA : 8ème LIGNE HORIZONTALE, HPV : 8ème LIGNE HORIZONTALE, ARS : 9ème LIGNE HORIZONTALE, TETANOS : 11ème LIGNE HORIZONTALE, DGS : 11ème LIGNE HORIZONTALE, COVID : 12ème LIGNE HORIZONTALE, EMH : 12ème LIGNE HORIZONTALE, VRS : 13ème LIGNE HORIZONTALE, HAS : 13ème LIGNE HORIZONTALE, GRIPPE : 14ème LIGNE HORIZONTALE.



Testez vos connaissances SUR LA VACCINATION ?

Un moment **pour vous**, un geste **pour votre santé**.

#JeMeVaccine

#JeNousProtège

Les 2 Familles : Trouvez la bonne catégorie des vaccins

VACCINS VIVANTS (ATTÉNUÉS)

Vaccins contre-indiqués chez les immunodéprimés et les femmes enceintes (*ou autre contre-indication spécifique*).

VACCINS NON-VIVANTS (INERTES)

(inactivés, ARNm, etc.) utilisables pour tout le monde (*sauf contre-indication spécifique*).

BCG
HÉPATITE B
ROTAVIRUS
POLIOMYÉLITE
ROR
TÉTANOS
ZONA
COVID-19
VARICELLE
COQUELUCHE
FIÈVRE JAUNE
GRIPPE

LES VACCINS VIVANTS ATTÉNUÉS : BCG (TUBERCULOSE), VARICELLE, ROR, ROTAVIRUS, FIÈVRE JAUNE, POLIOMYÉLITE (FORME VIVANTE ET ORALE OFFRANT UNE EFFICACITÉ ACCRUE ET UNE FACILITÉ D'UTILISATION - NON DISPONIBLE EN FRANCE : UTILISÉ DANS LES PAYS OÙ CIRCULE ENCORE LE VIRUS CAR PLUS EFFICACE ET PLUS FACILE À UTILISER, GRIPPE (FORME INTRANASALE - SERA BIEN TÔT DISPONIBLE EN FRANCE).
LES VACCINS NON-VIVANTS INACTIVÉS : COVID-19, HÉPATITE B, TÉTANOS, COQUELUCHE, GRIPPE, ZONA, POLIOMYÉLITE (FORME INJECTABLE : DISPONIBLE EN FRANCE).



Testez vos connaissances SUR LA VACCINATION ?

Un moment **pour vous**, un geste **pour votre santé**.

#JeMeVaccine

#JeNousProtège

Les effecteurs : Reliez le vaccin correspondant à l'effecteur.

HPV

ZONA

ROUGEOLE

PNEUMOCOQUE

COVID

GRIPPE



*Coup de pouce vers
le mémo effecteurs*



1. Est prescrit dès l'âge de 6 mois par un médecin ou une sage-femme et dès l'âge de 5 ans par un pharmacien ou un infirmier.

2. Est prescrit chez les personnes immunodéprimées de plus de 18 ans et chez toutes les personnes âgées de 65 ans et plus, par les médecins, sages-femmes, pharmaciens et infirmiers ;

3. Est prescrit sous forme de bon de prise en charge par les médecins et sages-femmes, ainsi que les infirmiers et pharmaciens chez les 11 ans et plus ;

4. Est prescrit par les médecins, sages-femmes, pharmaciens ou un infirmiers chez tous les jeunes jusqu'à leur 19 voire 26 ans ;

5. Est prescrit chez le nourrisson par les médecins, ainsi que par les sages-femmes lorsque l'enfant n'est pas immunodéprimé ;

6. Est prescrit chez le nourrisson et les personnes âgées par les médecins et les sages-femmes, même chez les immunodéprimés. Peut être prescrit chez les adultes atteints de comorbidités par les pharmaciens et infirmiers.

1. COVID-19 - 2. ZONA - 3. GRIPPE - 4. HPV - 5. ROUGEOLE - 6. PNEUMOCOQUE