









Recommandations

VACCINALES

- Vaccination recommandée pour toutes les jeunes filles et les jeunes garçons âgés de 11 à 14 ans révolus
- Rattrapage vaccinal possible pour les jeunes femmes et les jeunes hommes entre 15 et 19 ans révolus (jusqu'à l'âge de 26 ans pour les hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes (HSH))

Toute nouvelle vaccination doit être initiée avec le vaccin Gardasil 9®. C'est le vaccin prescrit dans le cadre de cette campagne scolaire. *Gardasil 9® et Cervarix® ne sont pas interchangeables (toute vaccination initiée avec un vaccin doit être finalisée avec le même vaccin).*

Contre-indications : hypersensibilité à un des composants ou à une précédente vaccination avec le même vaccin.

Dans le cadre de la campagne scolaire, un temps d'observation post-vaccinale de 15 minutes doit être effectué (fiche ANSM).

SCHEMAS VACCINAUX DU GARDASIL9®



1ère dose effectuée entre 11 et 14 ans 2 doses à M0 puis M5-13

Rattrapage : 1ère dose effectuée entre 15 et 19 ans 3 doses : M0, M2 puis M6

En cas de retard dans la 2ème ou 3ème injection, la vaccination sera complétée de la ou des dose(s) manauante(s)

Pour les HSH, rattrapage possible jusqu'à 26 ans

CO-ADMINISTRATION (SITE D'INJECTION SÉPARÉ)

tous les adolescents

- rappel dTcaP (diphtérie tétanos polio coqueluche) prévu entre 11 et 13 ans
- méningocoque ACWY prévu entre 11 et 14 ans

en situation de rattrapage vaccinal

- ROR (rougeole, oreillons et rubéole)
- hépatite B

MODALITÉS D'UTILISATION

ADMINISTRATION



Injection en intramusculaire dès la sortie du réfrigérateur. Ne doit pas être injecté par voie intravasculaire, sous-cutanée ou intradermique

De préférence dans la région deltoïdienne de la partie supérieure du bras ou dans la région antérolatérale supérieure de la cuisse

PREPARATION



Agiter et inspecter visuellement avant administration *Ne doit pas être mélangé dans la même seringue avec d'autres vaccins ou solutions*

CONSERVATION



3 ans entre 2 et 8°C à l'abri de la lumière

Ne pas congeler

En cas d'excursion de température, vérifier les modalités de gestion dans le RCP, contacter au besoin l'OMEDIT

LOGISTIQUE



Livraison de 48 heures *Précommandes et livraisons décalées non disponibles*



Commandes sont à effectuer préférentiellement les deuxièmes quinzaines du mois auprès de MSD msdcommandes@msd.com

FICHE TECHNIQUE GARDASIL 9®




AMM: EU/1/15/1007/002

- indication dès l'âge de 9 ans
- contre les maladies provoquées par les HPV de types 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 et 58.



Gardasil 9 Susp inj en seringue préremplie

- seringue de 1 dose (0.5ml) prête à l'emploi avec 2 aiguilles
- UCD: 3400894258827
- · conditionnement unitaire
- étiquettes doubles détachables
- · emballage secondaire en carton













présentation du produit



CIRCUIT DE LA LIVRAISON DEPUIS LE LABORATOIRE

STOCKAGE EN CHAMBRE FROIDE



Stockage en chambre froide (+2°C/+8°C).



Mesure et enregistrement en continu des températures, 24h/24, 7j/7.

PRÉPARATION DES COMMANDES



Préparation des commandes en chambre froide (+2°C/+8°C).



Emballages recyclables et coussins d'air, pour permettre une répartition homogène de l'air froid et assurer une protection mécanique optimale.



Mesure et enregistrement en continu des températures. 24h/24, 7j/7.

TRANSPORT



Enlèvement sur des quais à température contrôlée



Camions réfrigérés bi-température (dont +2°C/+8°C) : qualité de transport en toute indépendance vis-à-vis des températures extérieures quelle que soit la saison.



Etiquette +2°C - +8°C sur tous les colis.



Mesure et enregistrement en continu des températures. 24h/24, 7j77.

LIVRAISON



Remise du colis après signature du réceptionnaire. Relevé de température sur le récépissé de transport.



Mise à disposition des courbes de température sur simple demande.



En cas d'excursion de température constatée pendant le transport, le département Assurance Qualité de MSD France est averti dans les plus brefs délais pour indiquer la conduite à tenir.




Etiquette +2°C - +8°C sur tous les colis. Informations sur le colis et la livraison.

Au départ de tournée: le transporteur ETP scanne le colis pour le prendre en charge et édite la feuille de tournée.



- Lors de la livraison chez le destinataire, le transporteur ETP scanne l'étiquette de transport sur le colis ou à la palette, fait émarger la feuille de tournée papier = bon de livraison (cachet, signature, nom du signataire et réserves éventuelles).
- Le transporteur ETP via son PDA renseigne immédiatement le statut et prend en photo la preuve de livraison.

Pour plus d'informations



- Vaccination info-service pour le grand public et les professionnels
- Assurance maladie

- RCP Gardasil 9®
- Mesvaccins.net

Inca: 8 arguments clés sur cette vaccination

- Association Sparadrap
- ARS N-A : page dédiée