



contre le VRS



Résumé des recommandations vaccinales : entre **septembre et janvier**, vaccination de toutes les **femmes enceintes entre 32 et 34 semaines d'aménorrhées** (DGS-Urgent 24-13).

Changements à venir (attente d'un DGS-urgent et des arrêtés de remboursement pour ces nouvelles indications) :

- vaccination des **personnes à risque¹** de 65 ans et plus ;
- vaccination de toutes les personnes de **75 ans et plus**.

Le virus respiratoire syncytial (VRS) est le principal agent infectieux de la bronchiolite chez les **nourrissons**. Chez **l'adulte**, il provoque des infections respiratoires aiguës (IRA), pouvant entraîner des complications graves et une perte d'autonomie. L'infection ne confère pas d'immunité durable, et les **réinfections peuvent survenir tout au long de la vie**.

L'épidémie saisonnière commence généralement à la mi-novembre, atteint un pic en décembre et se termine à la fin de l'hiver. En s'ajoutant au Covid-19 et à la grippe, le VRS entraîne une lourde charge pour le système de soins.

VACCINATION DE LA FEMME ENCEINTE

Le choix est donné aux futurs parents entre la vaccination de la femme durant sa grossesse ou l'administration d'anticorps monoclonaux au nourrisson

mémo OMEDIT NAGG anticorps monoclonaux, guide HAS "bronchiolite, comment protéger votre bébé"



Protection indirecte du nouveau-né par la vaccination de la mère durant sa grossesse

NOUVEAU



1 dose d'Abrysvo® chez les femmes enceintes d'un âge gestationnel compris entre 32 et 36 SA (semaines d'aménorrhées) entre septembre et janvier.

DGS-urgent 24-13



Co-administration possible avec les vaccins contre la grippe et Covid-19, délai de 2 semaines avec le vaccin dTcaP.

avis HAS protection des nourrissons et guide HAS "bronchiolite, comment protéger votre bébé"



POURQUOI ?

Permet la protection du nouveau-né dès la naissance grâce aux anticorps maternels transférés via le placenta.

Limite le nombre de vaccinations administrées au nouveau-né, si c'est un sujet de questionnement des parents.

Efficacité probable en cas de mutation du virus.

Le saviez-vous ? Vacciner la mère pour protéger le nourrisson à sa naissance est une méthode de prévention également utilisée pour la coqueluche. D'ailleurs, la vaccination contre la coqueluche est recommandée à chaque grossesse.

voir notre mémo sur la grossesse

POINTS DE VIGILANCE

Efficacité réduite de la vaccination si la mère est **immunodéprimée** ou si le nouveau-né naît **prématurément** ou moins de 14 jours après la vaccination de la mère.

Efficacité maximale à la naissance, et devient plus faible 6 mois après.

Le risque d'augmenter le nombre de naissances prématurées n'est pas confirmé, bien que cela ait été observé avec un autre vaccin similaire.

VACCINATION DES SENIORS ET DES PERSONNES À RISQUE

À VENIR

avis HAS vaccination des 60 ans et plus



Personnes à risque¹ âgées de plus de 65 ans




Toutes les personnes âgées de plus de 75 ans

1 dose d'Abrysvo® ou d'Arexvy®

Co-administration possible avec le vaccin contre la grippe, délai de 2 semaines avec le vaccin dTcaP (Abrysvo®)

Le saviez-vous ? Toutes les personnes de 65 ans et + sont concernées par la vaccination grippe, Covid-19 et zona. Dès 75 ans, s'ajoute à ces 3 vaccinations celle contre le VRS. Les rappels dTP sont à effectuer tous les 10 ans à partir de 65 ans. Les adultes atteints de maladies chroniques, quel que soit leur âge, sont aussi concernés par la vaccination pneumocoque.

¹ personnes à risque : pathologies respiratoires chroniques (notamment BPCO) ou cardiaques (notamment insuffisance cardiaque).

 **Aucun vaccin n'est indiqué chez les nourrissons. Les médicaments préventifs disponibles chez les nourrissons sont des anticorps monoclonaux.**

mémo OMEDIT NAGG anticorps monoclonaux, guide HAS "bronchiolite, comment protéger votre bébé"



DGS-urgent 24-13, RCP Abrysvo®, RCP Arexvy®, Summary of opinion mResvia®



Abrysvo®

indication actuelle : chez les femmes enceintes
indication à venir : chez les personnes de 60 ans et +

Caractéristiques : vaccin bivalent (sous-groupes A et B), recombinant

Taux de remboursement pour les femmes enceintes : 100 %

Disponibilité pour les femmes enceintes : courant septembre dans les établissements de santé publics/privés et dans les officines

Modalités de commande pour les femmes enceintes : à venir

Disponibilité pour les 60 ans et plus : à venir (en attente DGS-urgent et remboursement)

Préparation pour l'administration : vaccin en poudre à reconstituer uniquement avec le solvant fourni et à utiliser immédiatement ou au plus tard 4 heures après si conservé entre 15 et 30°C

Conservation avant reconstitution : entre 2-8°C | **Administration** : en IM (deltoïde)

Contre-indications : hypersensibilité aux substances actives ou à l'un des excipients



Arexvy®

indication à venir : chez les personnes de 60 ans et +

Caractéristiques : vaccin recombinant, avec adjuvant

Disponibilité : à venir (en attente DGS-urgent et remboursement)

Préparation pour l'administration : vaccin en poudre à reconstituer uniquement avec le solvant fourni et à utiliser immédiatement ou au plus tard 4 heures après si conservé entre 2 et 25°C

Conservation avant reconstitution : entre 2-8°C | **Administration** : en IM (deltoïde)

Contre-indications : hypersensibilité aux substances actives ou à l'un des excipients



mResvia®

indication à venir : chez les personnes de 60 ans et +

Caractéristiques : vaccin à ARNm

Disponibilité : avis initial positif de l'EMA



POUR INFO



avis HAS vaccination des 60 ans et plus, avis HAS vaccination des femmes enceintes et bilan de la surveillance bronchiolite hivernale 2022-2023 de SpF



1 Chez les adultes, une moyenne de **2782 hospitalisations par an** a été rapportée durant la période 2015-2020. Les adultes âgés de 65 ans et plus représentaient 77 % de ces hospitalisations.

2 Une moyenne de **709 admissions annuelles en services de soins critiques** a été rapportée sur la période 2015-2020. Les adultes âgés de 65 ans et plus représentaient 66 % des admissions parmi les adultes de 18 ans et plus.

3 Hiver 2022-2023, la bronchiolite a causé **73 262 passages aux urgences** et **26 104 hospitalisations** après passage aux urgences.

4 La bronchiolite touche chaque hiver près de **30 % des nourrissons de moins de 2 ans**, soit environ 480 000 cas par an. Les épidémies de bronchiolite représentent la première cause d'hospitalisation en pédiatrie.

POUR EN SAVOIR PLUS



Synthèses d'informations pour le grand public

- **Vaccination-info-service version grand public** : pages dédiées aux maladies à prévention vaccinale ;
- **Santé publique France** (flyers) : bronchiolite, gestes barrières en hiver ;
- **Ministère de la santé** : FAQ bronchiolite grand public ;
- **HAS** : guide "bronchiolite, comment protéger votre bébé d'une forme grave ?".



Synthèses d'informations pour les professionnels

- **OMEDIT NA vaccination boîte à outils** : mémos et guides dédiés aux maladies à prévention vaccinale ;
- **OMEDIT NAGG** : mémos dédiés aux médicaments, dont celui sur les anticorps monoclonaux contre le VRS ;
- **Vaccination-info-service version professionnelle** : pages dédiées aux maladies à prévention vaccinale² ;
- **Ministère de la santé** : FAQ bronchiolite pour les professionnels.



Réglementation et politiques vaccinales

- **Calendrier vaccinal de l'année en cours** : le document de référence précisant les recommandations vaccinales² ;
- **DGS-urgent** : recommandations vaccinales actualisées selon les épidémies en cours, dont le 2024-13 ;
- **Arrêtés** : modifiant la liste des spécialités 1) remboursables aux assurés sociaux du 13/08/24 2) et agréées à l'usage des collectivités et divers services publics du 13/08/24.



Données scientifiques

- **Santé publique France** : pour chaque maladie, bilan de la surveillance bronchiolite hivernale 2022-2023 et surveillance des IRA (infections respiratoires aiguës).



Évaluations des recommandations vaccinales et des vaccins

- **Commission technique des vaccinations de la HAS** : VRS femme enceinte 06/06/24, VRS protection des nourrissons 06/06/24, VRS protection des personnes de 60 ans et + 27/06/24 ;
- **Commission de la Transparence de la HAS** : avis de remboursement de l'Abrysvo® du 10/07/24.

²Les informations relatives au VRS seront prochainement ajoutées à ces sources.