




## Indication

Inscription sur la liste des médicaments agréés aux collectivités.

L'indication thérapeutique ouvrant droit à une prise en charge par l'Assurance maladie est :



Prise en charge des patients âgés de 12 ans ou plus et pesant au moins 40 kg, hospitalisés pour la COVID-19 avec une pneumonie nécessitant une oxygénothérapie à faible débit.



**Agrément aux collectivités** (arrêté du 4 août 2022, suite à l'avis de la CT le 23 octobre 2020)



Administration par **voie IV** (perfusion après reconstitution et dilution)



Dans cette indication, la durée totale du traitement doit être au **minimum de 5 jours et ne pas être supérieure à 10 jours.**

## Posologie



Une dose de charge unique de 200 mg (perfusion IV)



J2  
Jours suivants

Une dose de 100 mg (perfusion IV) par jour

**1 patient = Entre 6 (min) et 11 flacons (max)**

**Insuffisance rénale** : La pharmacocinétique n'a pas été évaluée chez les patients ayant une insuffisance rénale. **Le remdesivir ne doit pas être utilisé chez les patients avec un DFGe < 30 ml/min**

**Insuffisance hépatique** : non évaluée

**Personnes âgées** : Aucune adaptation posologique nécessaire chez les patients âgés de plus de 65 ans

**Grossesse** : Le remdesivir ne doit pas être utilisé pendant la grossesse à moins que la situation clinique de la femme ne justifie le traitement avec ce médicament

## Approvisionnement



- Approvisionnement par le stock Etat :
  - **Contactez et transmettez vos besoins à l'OMEDIT Nouvelle-Aquitaine Guadeloupe** à l'adresse suivante : [omedit@omedit-nag.fr](mailto:omedit@omedit-nag.fr)
- Renseignements hebdomadaires des stocks sur e-dispostock