

Campagne de vaccination contre les papillomavirus dans les collèves

Qui est concerné ?

 **Toutes les filles et tous les garçons de 11 à 19 ans**
Pour les candidats à la transplantation d'organe : dès 9 ans
Pour les hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes : jusqu'à 26 ans

Toute nouvelle vaccination doit être initiée avec le vaccin Gardasil 9®

Les vaccins Gardasil9® et Cervarix® ne sont pas interchangeables (toute vaccination initiée avec un vaccin doit être finalisée avec le même vaccin)

Contre-indications : hypersensibilité à un composant ou à une précédente vaccination avec le même vaccin

En cas de retard dans la 2e ou 3e injection, la vaccination sera complétée de la ou des dose(s) manquante(s)

Une co-administration est possible avec le rappel DTP coqueluche prévu entre 11 et 13 ans

Quels sont les schémas vaccinaux du Gardasil9® ?

  →   **1ère dose effectuée entre 11 et 14 ans :**
2 doses espacées de 6 à 13 mois
11 - 14 ans **x2**

  →   **1ère dose effectuée entre 15 et 19 ans :**
3 doses selon un schéma à 0, 2 puis 6 mois
Pour les HSH*, rattrapage possible jusqu'à 26 ans
15 - 19 ans **x3**
(HSH : 26 ans)
*Homme ayant des rapports sexuels avec des hommes

Quelles sont les modalités d'utilisation du vaccin Gardasil9® ?

Conservation

Avant ouverture

Entre 2 et 8°C durant 36 mois* (à l'abri de la lumière, au réfrigérateur, dans son emballage)  **2-8°C**
36 mois

Après ouverture

Entre 0 et 2°C durant 72h
Entre 8 et 40°C durant 96h



Ne pas congeler

En cas d'excursion de température, ne pas jeter les flacons et contacter l'OMEDIT NA

* se référer à la date de péremption du lot

Préparation

Agiter et inspecter visuellement avant administration 

Administration

Injection en IM dès la sortie du réfrigérateur 
De préférence dans la région deltoïdienne de la partie supérieure du bras ou dans la région antérolatérale supérieure de la cuisse

FAQ LOGISTIQUE GARDASIL9®



✓ Oui, la production pour la campagne nationale a été anticipée par le laboratoire producteur du Gardasil9® (MSD)



✓ Oui, le maillage permettra de distribuer les vaccins sur le territoire dans un délai de livraison de 48 heures



✓ **Les commandes sont à effectuer préférentiellement les deuxièmes quinzaines du mois auprès de MSD**
Pas de pré-commande, ni de livraison décalée



✓ Les lots qui seront distribués à partir de septembre arriveront à péremption en mai 2025.

Ressources pour aller plus loin

[INCA, son infographie dynamique et ses 8 arguments clefs](#)

ARS Nouvelle-Aquitaine : [site dédié](#)

RCP du [Gardasil9®](#) et celui du [Cervarix®](#)

Vaccination-info-service pour le [grand public](#) ou les [professionnels](#)

[Assurance Maladie](#) : faire le point avec son médecin

[Calendrier vaccinal 2023](#)

Publications de [Santé Publique France](#)

Formation en ligne gratuite [STOP HPV Isère](#)

MOOC PNS gratuit de [l'Université Paris Cité](#) et de [l'AUF](#)

MAJ le 19/06/2023

<https://www.omedit-nag.fr/vaccination>