



Calendrier vaccinal 2026 simplifié

Stade de la grossesse (mois)	1 ^{er} au 3 ^{ème}	4 ^{ème} au 6 ^{ème}	7 ^{ème}	8 ^{ème}	9 ^{ème}	Post-partum
Grippe	À n'importe quel stade de la grossesse, pendant la campagne de vaccination automnale					
Covid	À n'importe quel stade de la grossesse, pendant la campagne de vaccination automnale					
Coqueluche		À chaque grossesse (entre 20 et 36 SA), toute l'année				Si pas de vaccination pendant la grossesse : vacciner mère et entourage (stratégie du cocooning)
VRS (bronchiolite)				entre 32 et 36 SA pendant la saison épidémique*		Si pas de vaccination pendant la grossesse : médicament préventif pour le nourrisson (anticorps)

Suivi des vaccins reçus pendant ma grossesse, à remettre dans le carnet de santé de mon enfant dès sa naissance

*campagne 2025-2026 : à partir du 1^{er} septembre 2025 (DGS-urgent 2025-15)

SA : semaines d'aménorrhée

Grippe

La vaccination contre la grippe est recommandée chez la femme enceinte, quel que soit le stade de la grossesse, pendant la campagne de vaccination automnale, afin de protéger la mère de potentielles complications en cas d'infection.

Covid-19

La vaccination contre le Covid-19 est recommandée chez la femme enceinte, quelque soit le stade de la grossesse, pendant la campagne de vaccination automnale, afin de protéger la mère et son bébé de potentielles complications.

Coqueluche

La vaccination contre la coqueluche est recommandée, à chaque grossesse, au 2ème trimestre, entre 20 et 36 semaines d'aménorrhée afin de protéger le nouveau-né dès la naissance.

- Si la vaccination n'a pas été réalisée pendant la grossesse, la mère doit être vaccinée en post-partum immédiat, même si elle allaite.
- Si la mère a accouché moins d'un mois après la vaccination ou si elle n'a pas été vaccinée pendant la grossesse, la vaccination de l'entourage est recommandée (stratégie de cocooning).

Virus Respiratoire Syncytial (VRS)

La vaccination contre le VRS est recommandée chez la femme enceinte entre 32 et 36 semaines d'aménorrhée, en amont et pendant la période de circulation du virus (automne-hiver). La vaccination de la mère pendant la grossesse permet de protéger le nourrisson dès sa naissance et jusqu'à ses 6 mois contre les bronchiolites dues au VRS. 1 dose de vaccin est à réaliser.

Pour info

- Avant la grossesse, il est recommandé de faire un bilan des vaccins réalisés, notamment le vaccin Rougeole-Oreillons-Rubéole (ROR) et de vérifier l'immunisation contre la varicelle.
- Après la grossesse, et même si la femme allaite, il est possible de vacciner la mère avec la plupart des vaccins. Des précautions sont toutefois à respecter pour certains vaccins.

Pour en savoir + : outil OMEDIT vaccination et allaitement

