



Résumé des recommandations vaccinales :

- Vaccination **recommandée** pour les personnes **exposées et/ou à risque** et aux **voyageurs** séjournant dans des pays où le niveau d'hygiène est précaire.
- **Remboursement** : Vaccins monovalents contre l'hépatite A sont remboursés à 65% par l'Assurance Maladie **uniquement** pour les patients atteints de mucoviscidose ou d'hépatopathie chronique

L'hépatite A est une infection du foie provoquée par le virus de l'hépatite A (VHA). Le VHA se transmet principalement par voie féco-orale ou alimentaire. Il existe aussi une transmission sexuelle du virus, notamment dans les communautés homosexuelles.

RECOMMANDATIONS VACCINALES

La vaccination est recommandée chez :



- Les jeunes accueillis en établissements et service pour l'enfance et la jeunesse handicapée ;



- Les patients atteints de **mucoviscidose** et/ ou **pathologie hépatobiliaire** susceptible d'évoluer vers une hépatopathie chronique ;



- Les enfants, à partir de l'âge d'un an, nés de familles dont l'un des membres (au moins) est originaire d'un pays de haute endémicité et qui sont susceptibles d'y séjourner



- Hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes (HSH)



Pour les **professionnels** :

- S'occupant d'enfants n'ayant pas atteint l'âge de la propreté ;
- Des structures d'accueil collectives pour personnes handicapées ;
- Chargés du traitement des eaux usées et des égouts ;
- Impliqués dans la préparation alimentaire en restauration collective.



Pour les **voyageurs** âgés de plus d'1 an devant séjourner dans un pays où le niveau d'hygiène est précaire, quelles que soient les conditions du séjour (1).

SCHEMAS VACCINAUX



De 12 mois à 15 ans révolus

Avaxim 80®



1 dose + 1 rappel 6 mois à 10 ans après la primovaccination

Havrix 720®



1 dose + 1 rappel 6 à 12 mois plus tard (5 ans max)



Adultes

Avaxim 160® à partir de 16 ans



1 dose + 1 rappel 6 à 12 mois plus tard (3 ans max)

Havrix 1440® à partir de 15 ans



1 dose + 1 rappel 6 à 12 mois plus tard (5 ans max)

Vaqta 50®, à partir de 18 ans



1 dose + 1 rappel 6 à 18 mois plus tard



Voyageurs : à partir de l'âge de 1 an pour les séjours dans un pays où le niveau d'hygiène est précaire (1)

- 1ère dose : 15 jours avant le départ
- 2ème dose (rappel) à partir de 6 mois après la 1ère dose ou éventuellement de façon plus tardive, suivant un délai spécifique à chaque vaccin (cf. AMM du vaccin).

(1) Un examen sérologique préalable à la recherche d'anticorps anti VHA totaux ou IgG est pertinent pour les personnes ayant des antécédents d'ictère, ayant passé leur enfance en zone d'endémie, nées avant 1945. La présence d'anticorps anti VHA (IgG) traduit une immunité antérieure et ne justifie pas l'administration de doses vaccinales.

RECOMMANDATIONS AUTOUR D'UN CAS D'HÉPATITE A

Avis HCSP 2009



Maladie à Déclaration Obligatoire :

Déclaration à faire à l'ARS des cas cliniques ou confirmés :

Investigation rapide autour du cas (procédure). Cerfa 12614-02 Hépatite aigüe A à envoyer à ars33-alerte@ars.sante.fr



Isolement du malade :

pendant toute la période de contagiosité, à savoir dès les premiers symptômes et jusqu'à 10 jours suivant le début de l'ictère ou des signes cliniques.



Vérifier et protéger les contacts et les professionnels de santé. Vérification des statuts vaccinaux et mise à jour des vaccinations des contacts réceptifs selon les schémas vaccinaux de post-exposition.

SCHEMAS VACCINAUX POST-EXPOSITION

En présence d'un ou plusieurs cas d'hépatite A confirmé, la **vaccination est recommandée** pour :

- **L'entourage familial** ou toute personne vivant sous le même toit que le cas, uniquement pour les personnes n'ayant jamais été vaccinées contre l'hépatite A :
 - Si l'ensemble des critères suivants est présent : né après 1945, sans antécédent connu d'ictère et n'ayant pas séjourné plus d'un an dans un pays de forte endémicité : **vacciner le plus tôt possible**, sans examen sérologique préalable et dans les 14 jours suivant l'apparition des signes cliniques du cas.
 - Si au moins une condition n'est pas remplie, une sérologie préalable est fortement recommandée (recherche d'anticorps témoins d'une immunité ancienne), à condition que sa réalisation soit compatible avec le délai de 14 jours suivant l'apparition des signes cliniques du cas.
- Les **communautés de vie en situation d'hygiène précaire** : vaccination de la population exposée (à définir par investigation épidémiologique) dans les 14 jours suivant l'apparition des signes cliniques du cas.

VACCINS DISPONIBLES



Les vaccins monovalents contre l'hépatite A (pédiatriques et adultes) sont remboursés à 65% par l'Assurance Maladie dans les cas suivants :

- patients atteints de mucoviscidose
- patients atteints d'hépatopathies chroniques actives (en particulier hépatite B et C)

Dans les autres cas, ils ne sont pas remboursés. Certaines mutuelles prennent en charge une partie du coût du vaccin pour les voyageurs.




Hep A

Enfant de 1 à 15 ans

Avaxim 80®

Vaccin pédiatrique inactivé **monovalent contre l'hépatite A**.
Suspension injectable en seringue préremplie.



Hep A

Enfant de 1 à 15 ans

Havrix 720®

Vaccin pédiatrique inactivé **monovalent contre l'hépatite A**.
Suspension injectable en seringue préremplie.



Hep A

Adulte à partir de 16 ans

Avaxim 160®

Vaccin adulte inactivé **monovalent contre l'hépatite A**.
Suspension injectable en seringue préremplie.



Hep A

Adulte à partir de 15 ans

Havrix 1440®

Vaccin adulte inactivé **monovalent contre l'hépatite A**.
Suspension injectable en seringue préremplie.



Hep A

Adulte à partir de 18 ans

Vaqua 50®

Vaccin adulte inactivé **monovalent contre l'hépatite A**.
Suspension injectable en seringue préremplie.



Hep A - Hep B

Adulte à partir de 16 ans

Twinrix Adulte®

non pris en charge par l'Assurance Maladie

Vaccin adulte **bivalent contre l'hépatite A et l'hépatite B**.
Suspension injectable en seringue préremplie



Hep A - Typhoïde

Adulte à partir de 16 ans

Tyavax®

non pris en charge par l'Assurance Maladie

Vaccin adulte **bivalent contre l'hépatite A et typhoïdique**.

Arrêt de commercialisation faisant suite à un arrêt de la production en 2021. Épuisement des stocks depuis mars 2024

Conservation : entre 2-8°C | **Administration** : en IM

Contre-indications : hypersensibilité aux substances actives ou à l'un des excipients, à la néomycine ou au formaldéhyde (vaccin monov. hep A)

Prescripteurs chez les moins de 11 ans (hors voyage): médecins et sages-femmes

Prescripteurs chez les 11 ans et plus (hors voyage) : médecins, sages-femmes, pharmaciens et infirmiers

POUR INFO



- 1 En 2021, en France, 423 cas d'hépatite aiguë A ont été notifiés (contre 411 en 2020 et 1 379 en 2019). La moyenne d'âge était de 37 ans.
- 2 L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime à plus de 100 millions le nombre d'infections, causant environ 1,5 million de cas cliniques d'hépatite A chaque année.

- 3 La prévention de l'hépatite A repose sur le respect des mesures d'hygiène personnelle et collective, en particulier l'hygiène des mains et la vaccination et sur l'assainissement de l'environnement.

POUR EN SAVOIR PLUS



Synthèses d'informations pour le grand public

- Vaccination-info-service version grand public : page dédiée à l'hépatite A ;
- Santé publique France : pages dédiées à l'hépatite A ;
- Ministère de la santé : page dédiée à l'hépatite A ;
- CPAM : page dédiée à l'hépatite A ;
- OMS : page dédiée à l'hépatite A.



Synthèses d'information pour les professionnels

- Boîte à outils OMEDIT NA vaccination : autres mémos et jeux dédiés aux maladies à prévention vaccinale ;
- Vaccination-info-service version professionnelle : page dédiée à l'hépatite A.



Réglementation et politiques vaccinales

- Calendrier vaccinal de l'année en cours : pages dédiées à l'hépatite A ;



Données scientifiques

- Santé publique France : couvertures vaccinales, données épidémiologiques, données cliniques.



Évaluations des recommandations vaccinales et des vaccins

- HAS (avis) : hépatite A.

