

Les **méningocoques** sont des bactéries pouvant être responsables d'infection appelées "**invasives**", comme les méningites ou les septicémies. Les infections invasives à méningocoques peuvent ainsi entraîner des paralysies, voire le décès de la personne infectée.

Chaque année, plus de **500 personnes** sont touchées en France par une infection invasive à méningocoques. Les jeunes enfants et les adolescents figurent parmi les populations les plus concernées.

La **vaccination** contre les méningocoques B et ACWY constitue une protection efficace pour prévenir ces infections graves et leurs complications.

C'est quoi ? Les méningocoques sont des **bactéries** qui peuvent être présentes dans l'arrière du nez. Environ 10% de la population "porte" les méningocoques sans avoir de symptômes.

Pourtant, dans certaines circonstances, les méningocoques peuvent migrer dans le sang et être à l'origine d'une infection invasive sévère comme une **méningite** (infection cérébrale) ou une **septicémie**. Ils peuvent aussi être à l'origine d'une infection foudroyante, le "*purpura fulminans*". Ces maladies peuvent laisser des séquelles importantes (amputations, surdité, retard mental) voire s'aggraver jusqu'au décès. Les **nourrissons**, les **jeunes enfants** et les **jeunes adultes** sont particulièrement touchés.

La transmission de la bactérie se fait par gouttelettes de **salive** ou par **voie aérienne**, lors d'un contact **proche** (moins d'un mètre) et **répété** (foyer familial, collectivité) avec une personne infectée. En France, les souches de méningocoques les plus fréquemment responsables d'infection invasives sont les groupes B, W et Y.

Symptômes Des symptômes doivent alerter : une forte fièvre et/ou une ou plusieurs taches rouges ou violacées sur le corps d'apparition rapide. Chez le nourrisson, les symptômes de la méningite sont peu caractéristiques mais souvent inquiétants.



En cas de survenue de ces symptômes ou au moindre doute, appeler le **SAMU (15) afin d'avoir un avis médical**. Il s'agit d'une **urgence** médicale nécessitant l'administration d'un traitement adapté.

Se vacciner pour se protéger

Nourrissons et jeunes enfants



La **vaccination** joue un rôle **essentiel** pour protéger les enfants et les jeunes adultes contre les infections invasives à méningocoques. La vaccination contre les méningocoques ACWY et B est **obligatoire** chez les nourrissons nés à partir du 1er janvier 2023 selon les schémas présentés dans le tableau ci-dessous.

- **Méningocoques ACWY :**
1 dose à l'âge de 6 mois
et 1 dose à l'âge de 12 mois
- **Méningocoques B :** 1
dose à l'âge de 3 mois, 1
dose à l'âge de 5 mois et
1 dose à l'âge de 12 mois

Vaccinations obligatoires pour les nourrissons													
Âge approprié	1 mois	2 mois	3 mois	4 mois	5 mois	6 mois	11 mois	12 mois	16-18 mois	6 ans	11-13 ans	14 ans	
BCG													
DTP et Coqueluche													
Hib													
Hépatite B													
Pneumocoque													
ROR													
Méningocoques ACWY													
Méningocoque B													
Rotavirus													

Calendrier vaccinal 2026, Ministère de la Santé (version avril 2026)



Pour les enfants nés depuis 2020, qui n'ont pas encore été vaccinés contre les méningocoques ACWY et B et qui ont plus d'un an, un rattrapage vaccinal est à réaliser (1 dose de vaccin contre les méningocoques ACWY et 2 doses de vaccins contre les méningocoques B), même si ils ont déjà été vaccinés contre les méningocoques C.

Vaccins contre les méningocoques



Méningocoques ACWY : Nimenrix® (dès 6 semaines), Menquadfi® (dès 12 mois) ou Menveo® (dès 2 ans)

Méningocoque C (arrêt de commercialisation, certains enfants ont été vaccinés avec) : Menjugate® ou Neisvac®

Méningocoques B : Bexsero® (dès 2 mois) ou Trumenba® (dès 10 ans)

Pour info

1

En France, le nombre de cas d'infections invasives à méningocoques **augmente** depuis plusieurs années. Chaque année, environ 500 à 600 cas sont recensés et sont responsables d'une soixantaine de décès.

2

Le **méningocoque B** est la souche la plus fréquemment responsable d'infection invasive à méningocoques. A noter que l'incidence des infections dues aux sérogroupes **W** et **Y** augmente, surtout chez les nourrissons et les jeunes.

3

La vaccination contre les méningocoques est efficace. Dans les pays où la vaccination contre les méningocoques B et ACWY est recommandée, le nombre de cas a fortement diminué (jusqu'à 82 %). En France, la vaccination contre le méningocoque C a déjà permis de réduire le nombre d'infections invasives liées à ce séro groupe.

Pour en savoir +

La vaccination contre les méningocoques ACWY et B est aussi recommandée chez les **adolescents et jeunes adultes**. Consultez notre flyer dédié.



Synthèses d'informations disponibles sur internet :

- **Vaccination-info-service :** page dédiée (voir QR code)
- **Ministère de la Santé :**
 - Nouvelles obligations vaccinales méningocoques : Questions/réponses pour le grand public
 - Fiche d'aide au contrôle du statut vaccinal d'un enfant pour son entrée en collectivité à partir du 01/01/2025
- **Santé publique France :** fiche mémo "recommandations vaccinales contre les méningocoques"
- **Boîtes à outils OMEDIT mission vaccination :** à consulter sur notre site : www.omedit-nag.fr

