



MPOX - VARIOLE SIMIENNE



Les **orthopoxvirus** sont une famille de virus à laquelle appartiennent la variole et le mpox (nouveau nom du virus monkeypox). La vaccination contre la variole était obligatoire en France jusqu'au début des années 1980. Depuis, l'immunité vaccinale des populations a progressivement diminué, favorisant l'apparition de nouvelles épidémies telle que celle du mpox depuis le printemps 2022. La vaccination est recommandée en **pré et post-exposition**.

La maladie dure en général entre 2 et 3 semaines, pouvant aller parfois jusqu'à **4 semaines**. La plupart du temps, elle guérit toute seule. Les **personnes à risque de forme grave** sont les femmes enceintes, les jeunes enfants et les personnes immunodéprimées.

RECOMMANDATIONS VACCINALES PRÉ-EXPOSITION

Conseils de prévention de l'infection



Safe sex : nettoyage des sextoys



Respect des mesures barrières



Connaissance des symptômes et modes de transmission



Réactivité en cas de symptômes



Vérification régulière de son état cutané (y compris zone génitale)

Vaccination des personnes éligibles

Les personnes à très haut risque d'exposition

- Les hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes (**HSH**) et les personnes **trans** ayant des partenaires multiples
- Les **travailleurs du sexe**

Et aussi

- Les **femmes partenaires** occasionnelles ou **partageant** le même lieu de vie que des personnes à très haut risque d'exposition
- Les **professionnels** des lieux de consommation sexuelle
- Au cas par cas pour les **professionnels de santé** amenés à prendre en charge les personnes malades

immunocompétents **non vaccinés**
(dont les VIH+ taux CD4 >200/mm3)

2 doses espacées de 28 jours

immunodéprimés

3 doses espacées de 28 jours

immunocompétents **vaccinés avant 1980** avec un vaccin de 1ère génération

1 dose


si une **infection** mpox survient **après** la 1ère dose

pas de seconde vaccination

si une **infection** mpox survient **avant** la 1ère dose

pas de vaccination

Vous pouvez vous faire vacciner dans une structure dédiée
à retrouver sur santé.fr ou sur notre cartographie



RECOMMANDATIONS AUTOUR DES CAS MPOX



Déclaration des cas confirmés et probables à l'ARS
Cerfa 12554-03
à envoyer à
ars33-alerte@ars.sante.fr
(notice d'aide au remplissage)



Isolement du malade
Jusqu'à disparition des dernières croûtes, soit environ 3 semaines



Vaccination post-exposition des contacts à risque

- En 2 doses (3 si immunodéprimés, 1 si déjà vacciné avant 1980) sauf femmes allaitantes/enceintes, enfants et nouveaux nés (prendre avis spécialisé avant)
- Idéalement, dans les 4 jours après la date du 1er contact à risque (max 14 jours après) ([SpF_04/23](#))

Définition des contacts à risque MPOX ([SpF_04/23](#)) : toute personne

- Ayant eu un contact non protégé sans notion de durée avec la peau lésée ou les fluides biologiques d'un cas probable ou confirmé symptomatique*
- Ayant eu un contact physique indirect par le partage d'ustensiles de toilette, ou le contact avec des textiles (vêtements, linge de bain, literie) ou de la vaisselle sale utilisés par le cas probable ou confirmé symptomatique.*

PRÉCAUTIONS D'USAGE



En cas de **difficulté d'approvisionnement**, les immunodéprimés et les travailleurs du sexe doivent bénéficier en priorité des rendez-vous (VIS-pro).



Les vaccins peuvent être **co-administrés** en même temps que les autres vaccins du calendrier vaccinal, y compris les vaccins Covid-19 (HAS, 11/2022).



Contre-indication en cas d'hypersensibilité au trométamol, protéines de poulet, benzonase, gentamicine ou ciprofloxacine (08/2022, ANSM).



Reporting obligatoire par les effecteurs des **injections** sur **Démat Social** (MINSANTE 2022-58) ; les **stocks de vaccins** doivent être mis à jour chaque semaine par les PUI des GHT sur **e-dispostock**.



L'injection du vaccin doit se faire par voie **sous-cutanée**, de préférence dans le haut du bras.




IMVANEX® et JYNNEOS®


- sont **interchangeables** (calendrier vaccinal 2024)
- **autorisés en pré et post exposition** (arrêté du 9 juillet 2022)
- se **conservent** à $-20^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$ 3 ans ou à $-80^{\circ}\text{C} \pm 10^{\circ}\text{C}$ 9 ans. Après décongélation, ils peuvent être conservés à l'obscurité entre 2°C et 8°C pendant 2 mois au maximum avant l'utilisation (ANSM, 01/23). *Ces nouvelles conditions de conservation s'appliquent rétrospectivement aux lots déjà sur le marché sous réserve que les conditions de conservation autorisées aient été maintenues.*



DOC UTILES



vaccination-info-service
(tout public)
vaccination-info-service
(professionnels)



Sante.fr
Lieux de vaccination



calendrier vaccinal (p. 33-34)
recommandations générales,
particulières, professionnelles,
schémas vaccinaux



Définitions et conduites à tenir, SpF (04/2023)
Cas probables/confirmés
& cas contact



Sexo-safe




FAQ du ministère
informations générales, CAT en cas
de symptômes ou de contact avec
une personne malade, prise en
charge sanitaire, vaccination, divers



ANSM
Pour les professionnels
de santé
Pour les personnes
vaccinées



MONKEYPOX INFO SERVICE
de 8h à 23h 7/7j
LiveChat de 9h à 22h
FAQ



Outils de Santé Publique France
Fiches qu'est-ce que le mpox
français, albanais, anglais, arabe,
bulgare, espagnol, mandarin,
portugais, roumain et russe
Vidéo en langue des signes