



Âge	1 mois	2 mois	3 mois	4 mois	5 mois	6 mois	11 mois	12 mois	16-18 mois	6 ans
BCG										
DTCaP (diphtérie, tétanos, coqueluche, poliomyélite)										
Hib (Haemophilus influenzae de type b)										
Hépatite B										
Pneumocoque										
Méningocoque B										
Méningocoques ACWY										
ROR (rougeole, oreillons, rubéole)										
Rotavirus				si RotaTeq®						
VRS (Virus Respiratoire Syncytial)	Anticorps monoclonaux*									

 Vaccinations obligatoires (méningocoques ACWY et B depuis le 1er Janvier 2025)

*Si la mère ne s'est pas fait vacciner pendant la grossesse

Tuberculose (BCG)

Le vaccin contre la tuberculose est recommandé à partir de l'âge de 1 mois avec 1 dose avant la sortie de la maternité pour les enfants originaires de Guyane, de Mayotte ou ayant un membre de l'entourage atteint d'une tuberculose récente (moins de 5 ans). La vaccination peut être proposée si un départ est prévu en zone endémique.

Diphtérie-Tétanos-Coqueluche-Poliomyélite (DTCaP)

Primo vaccination en deux doses à deux mois d'intervalle, à l'âge de 2 mois et à 4 mois, suivi d'un rappel à l'âge de 11 mois.

Haemophilus Influenzae de type b (Hib)

Primo vaccination en 2 doses à 2 mois d'intervalle, à l'âge de 2 mois et à 4 mois, suivi d'un rappel à l'âge de 11 mois. Vaccin combiné avec le vaccin DTCaP.

Hépatite B

Primovaccination en 2 doses à 2 mois d'intervalle, à l'âge de 2 mois et à 4 mois, suivi d'un rappel à l'âge de 11 mois. Vaccin combiné avec le vaccin DTCaP ou non.

Pneumocoque

Primovaccination en deux doses, à 2 mois d'intervalle, à l'âge de 2 mois et à 4 mois, suivi d'un rappel à l'âge de 11 mois.

Méningocoque B

Depuis le 1er janvier 2025, la vaccination est obligatoire chez tous les nourrissons. Première dose à l'âge de 3 mois, deuxième dose à l'âge de 5 mois et troisième dose à l'âge de 12 mois.

Méningocoques ACWY

Depuis le 1er janvier 2025, la vaccination est obligatoire chez tous les nourrissons. Première dose à l'âge de 6 mois et deuxième dose à l'âge de 12 mois.

Rougeole-Oreillons-Rubéole (ROR)

Première dose à l'âge de 12 mois puis deuxième dose entre 16 et 18 mois.

Rotavirus

Vaccin recommandé à tous les nourrissons à partir de 2 mois avec 2 à 3 doses (par voie orale).

Virus Respiratoire Syncytial (VRS)

1 dose d'Anticorps monoclonaux dès la naissance (Beyfortus® (nirsevimab) pendant la période épidémique si pas de vaccination maternelle.

