

ROTAVIRUS

INFORMATION

NOURRISSONS
& JEUNES ENFANTS

Risque d'Invaginations Intestinales Aiguës (IIA)

Le rotavirus est un virus très **contagieux** qui cause des gastro-entérites. Chez les nourrissons et enfants de moins de 5 ans, il peut provoquer une déshydratation rapide nécessitant une hospitalisation. **La vaccination, recommandée chez le nourrisson, réduit de 80 % le risque de gastro-entérite et d'hospitalisation.** Elle se fait par voie orale, donc sans douleur pour le nourrisson.



L'IIA est un phénomène **d'occlusion intestinale** (morceau d'intestin qui se replie sur lui-même) qui peut **se produire spontanément**, en dehors de toute vaccination. Il existe une légère augmentation de la fréquence de ce phénomène dans les 7 jours suivant la vaccination contre les rotavirus (environ 1 à 6 cas pour 100 000 enfants).

Signes cliniques à surveiller



pleure de manière
inhabituelle



Pâleur



Dort
beaucoup



Refus de
s'alimenter



Vomissements
répétés



Sang
dans les selles

En cas de survenue de ces symptômes dans les 7 jours suivant la vaccination ou au moindre doute, consultez un **médecin** ou appeler le **SAMU (15)** afin d'avoir un **avis médical**.

Pour en savoir +



Dans les cas les plus fréquents :

- Recours à une échographie,
- Prise en charge médicale urgente (le plus souvent par un lavement).

Site du
Ministère

