

BRONCHIOLITE À VRS

PRÉVENTION

NOURRISSONS ET FEMMES ENCEINTES

CAMPAGNE D'IMMUNISATION 2026-27 :
à partir du 14 septembre 2026

La bronchiolite est une **infection respiratoire fréquente chez les nourrissons**. Elle est majoritairement causée par le **Virus Respiratoire Syncytial (VRS)** et peut entraîner des complications graves, surtout chez les bébés de moins de six mois. Chaque hiver, elle touche **30% des nourrissons de moins de 2 ans**.

Il existe plusieurs moyens de protéger votre bébé. En complément des gestes barrières, la **vaccination** contre le VRS **pendant la grossesse** ou **l'administration d'un médicament préventif au bébé** sont possibles.

Symptômes

Premiers symptômes pendant 1 à 10 jours



Rhume
(nez bouché qui coule)



Gêne pour respirer,
pour manger et dormir



Toux
modérée



Fièvre



Toux fréquente
et respiration sifflante



Dans la majorité des cas, la bronchiolite guérit spontanément au bout de 5 à 10 jours



Mais la toux peut persister pendant 2 à 4 semaines.

Protéger bébé

Des gestes barrières simples permettent de limiter la transmission du virus



Se laver les mains avant et après chaque change, tétée, repas ou calin.



Ne pas partager ses biberons, sucettes ou couverts non lavés.



Porter un masque en cas de rhume, toux ou fièvre.



Eviter d'emmener son enfant dans les endroits publics confinés.



Aérer régulièrement le logement.



Ne pas fumer à côté des bébés.

Qui ?



Tous les enfants qui connaîtront leur 1^{ère} saison d'exposition au VRS, c'est à dire leur 1^{ère} saison hivernale.



En complément, les enfants âgés de **moins de 2 ans** présentant certaines pathologies **cardiaques** et/ou **pulmonaires** susceptibles d'entraîner une plus grande vulnérabilité.



En complément des gestes barrières

2 options alternatives disponibles

La vaccination de la mère



Pendant la grossesse

- Toutes les femmes enceintes pour lesquelles le 8^{ème} mois de grossesse (**32 à 36 SA**) sera entre le 14 septembre 2026 et le 28 février 2027



Sauf si vaccin VRS reçu lors d'une précédente grossesse ou si femme enceinte avec immunodépression



Professionnels habilités

La vaccination peut vous être proposée par le professionnel de santé qui suit votre grossesse. Elle peut être réalisée par un **médecin, un gynécologue, une sage-femme, une infirmière ou un pharmacien ou encore en PMI.**

OU

L'immunisation de Bébé



Dès la naissance ou en rattrapage

- Tous les enfants exposés à leur premier hiver
- Si la mère a accouché moins de 14 jours après la vaccination, l'enfant est éligible.

NB : si la mère a été vaccinée pendant la grossesse et qu'il y a plus de 15 jours entre la vaccination et l'accouchement, il n'est pas nécessaire d'immuniser de nouveau le bébé

L'immunisation peut vous être proposée par le professionnel de santé qui suit votre enfant, à la maison, à la maternité ou en PMI (**médecin, pédiatre, sage-femme**).

Prise en charge financière



100% dans le cadre de votre grossesse

Vaccin **ABRYVO®** :



BEYFORTUS® (nirsevimab) / ENFLONSIA® (clesrovimab) :

100% Si immunisation réalisée à la maternité
(selon traitements proposés par la maternité)

NB : Si l'immunisation est délivrée en pharmacie, une partie est prise en charge par la Sécurité Sociale (65%). Le reste à charge peut être pris en charge par la complémentaire santé.



Pour info

D'autres vaccinations sont recommandées pendant la grossesse : **coqueluche, grippe, COVID-19** pour protéger bébé et la femme enceinte. Le vaccin contre le VRS peut être réalisé le même jour que le vaccin contre la grippe et le vaccin contre le COVID-19. Il faut attendre 2 semaines entre le vaccin contre la coqueluche et le vaccin contre le VRS.

L'immunisation de bébé **est complémentaire aux vaccins** qu'il recevra (ou a déjà reçu) pour le protéger contre d'autres maladies infectieuses. L'immunisation contre le VRS peut être réalisée le même jour que les vaccinations de votre enfant.

Qu'est ce qu'un vaccin ?



Le **vaccin** entraîne le système immunitaire à reconnaître les virus ou les bactéries afin de mieux protéger, sans rendre malade. Des anticorps sont produits suite à la vaccination.



Qu'est ce qu'un anticorps ?

Les **anticorps protègent contre les infections**. Pendant la grossesse, la mère transmet ses anticorps à son bébé, lui offrant une protection dès la naissance. Dans certains cas, des anticorps peuvent également être administrés directement au bébé.

Pour en savoir +

Synthèses d'informations disponibles sur internet :

- Vaccination-info-service** : pages dédiées aux maladies à prévention vaccinale ;
- Ministère de la Santé** : La bronchiolite c'est quoi ?
- Ministère de la Santé** : Foire aux questions sur la bronchiolite.
- Santé publique France** (flyers) : bronchiolite, gestes barrières en hiver ;
- Haute Autorité de Santé (HAS)** : Guide "bronchiolite, comment protéger votre futur bébé d'une forme grave ?"
- Boîte à outils OMEDIT** : site internet : www.omedit-nag.fr

