



VARIOLE B (MPOX)

VACCINATION



Qui ?

Comment ?

Què ?

En savoir +

Qui ?

Les personnes à risque, en **pré-exposition** ⁽¹⁾

- Les hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes (HSH) et les personnes trans ayant des partenaires multiples ;
- Les travailleurs et travailleuses du sexe ;
- Les partenaires occasionnelles ou partageant le même lieu de vie que des personnes à très haut risque d'exposition ;
- Les professionnels des lieux de consommation sexuelle ;
- Les voyageurs les plus à risque d'exposition ;

Les contacts à risque et les immunodéprimés ayant eu un contact étroit avec une personne-contact à risque en **post-exposition** ⁽¹⁾, dans les 4 jours après la date du 1^{er} contact à risque (*max 14 jours après*).

(1) ne sont pas concernées : les personnes de -18 ans, les femmes enceintes, les personnes vaccinées avant 1980 et les personnes ayant déjà contractées le Mpx entre 2022 et aujourd'hui

Où ?

sur www.santé.fr



Comment ?

Vaccin **Jynneos®** :

2 doses (ou 3 chez l'immunodéprimé, ou 1 si déjà vacciné avant 1980), espacées de minimum 28 jours et suivies d'un rappel environ 2 ans après.



Pour en savoir +

- **Vaccination-info-service**
- **Sexo-safe** : site d'information pour les hommes (cis, trans) ayant des relations sexuelles avec des hommes ;
- **OMEDIT NA vaccination** : boîte à outils

- **Ministère de la Santé** : FAQ (informations générales, que faire en cas de contact à risque, prise en charge médicale, vaccination, ...)



MPOX INFO SERVICE : 0801 90 80 69

Ligne téléphonique gratuite, liveChat, FAQ

Accessible 7j/7, de 8h à 23h.